

Coleoptera Uzbekistana. В литературе имеются лишь отдельные сведения об экологии и морфологии жуков-щелкунов этого региона, ряд видов известен только по первоописаниям.

SUMMARY. The article deals with the faunistic features of the family of baleen beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the Southern Aral Sea region. The fauna of baleen beetles in Central Asia has not yet been studied enough. This fully applies to the fauna of Coleoptera of Uzbekistan. The literature contains only a few data on the ecology and morphology of click beetles in this region; a number of species are known only from original descriptions.

SALSOLA RICHTERI (MOQ.) KAREL EX LITV. HÁM SALSOLA PALETZKIANA LITV.LER-TIYKARGÍ FITOMELIORANT ÓSIMLIKLER

M.A.Karlibayeva – tayanish doktorant

M.T.Baltabaev – biologiya ilimleriniń kandidati

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Tayanch soʻzlar: fitomeliyorant, yem-xashak oʻsimlik, ildiz tizimi, endemik turlar, cherkez urugʻi, novda, meva, vegetativ koʻpayish, barg, generativ faza, absolyut massasi, choʻl, alkaloidlar, qalamcha, qumli tuproq.

Ключевые слова: фитомелиоранты, кормовое растение, корневая система, endemic species, семена солянка Рихтера, побег, плод, вегетативная размножение, лист, генеративная фаза, абсолютная вес, пустыня, алкалоиды, черенка, песчаная почва.

Key words: phytomeliiorants, fodder plant, root system, Richter's solyanka seeds, fruit, vegetative reproduction, leaf, generative phase, absolute weight, desert, alkaloids, cutting, sandy soil.

Respublikamız gárezsizlikke eriskennen keyin tábiyyi ósimlik túrlerinen ekonomikanıń túrli tarmaqlarında fitomeliyorant, ot-jem hám dárilik shiyki zat ónimi retinde paydalanıw hám kóbeytiwge ayrıqsha itibar qaratılıp atır. Bul ilajlardı ámelge asırıwda xalıq aralıq hám mámleketlik áhmiyetke iye islenip atırǵan jumıslar, sonday-aq, Aral aldı hám Aral teńizi suwı qurıǵan aymaqlardıń házirgi ekologiyalıq halatın jaqsılaw, tábiyyi resurslardı anıqlaw, olardan óndiristiń túrli tarawlarında paydalanıw boyınsha nátiyjelerge erisildi. Ásirese, Aralboyı aymaǵındaǵı ósimlik túrleriniń hár túrliligin anıqlaw, olardıń bioekologiyalıq qásiyetlerin ilimiy tiykarlaw hám kelesheǵı bar ósimliklerden fitomeliioraciya jumıslarında paydalanıw keń engizilgen.

Usınday toǵay dúziwshi fitomeliyorant ósimlikler qatarına aq cherkez hám qara cherkezdi kiritiwge boladı, ol ámeliyatta keń qollanıladı. Bul túr qumbat bahalı ot-jemlik ósimlik bolıp esaplanadı. Cherkezdi hámme sharwa malları, ásirese túye hám qoy-eshkiler jıldıń hámme paslında súysinip jeydi. Qoylar jazda ósimliktiń japıraqların júdá súyip jeydi, gúzgi-qısqı dáwirde cherkez bahalı maylı ot-jem ósimlik bolıp xızmet etedi, sebebi shóp deneli hám yarım puta ósimlikler qar astında qalıp, jew mümkinshilikleri bolmay qaladı [2].

Cherkezdiń ashıq qumlarda ósiwi, kóp tuqım beriwi, qálemshe hám tuqım menen kóbeyiwi, duǵa shıdamlılıǵı, tamir sistemasınıń kúshli rawajlanıwı, qosımsha tamırlar payda etiw, onıń qumdı bekkemlewde eń tiykarǵı ósimlik sıpatında qalıpsıwında járdem beredi [2].

Bunnan tisqari aq cherkez mámleketlik farmokopeya quramına kiredi.

Miywelerinde, shaqalarında (pobeg) gipertoniya hám awır nerv keselliklerinde qollanılatuǵın alkaloidlar-salsolidin hám salsolin boladı [5].

Qaraqalpaqstan florasında tarqalǵan soralar (*Chenopodiaceae*) -tuqımlasınıń *Salsola* tuwısına kiretuǵın cherkezdiń 2 túri *Salsola richteri* (moq.) karel ex litv. hám *Salsola paletziana* litv. (aq hám qara cherkez) bar [6].

Salsola richteri kar.-boyı 3 metrge deyin ósetuǵın iri puta deneli ósimlik, Orta Aziyanıń qumlı shólistan endemigi esaplanadı, ol Respublikamızdıń barlıq qumlı shól jerlerinde ósedi.

Tuqımlı miyweleri - kúl reńli qızıl yamasa qızıl qanatlı bir dánli miywe. Iyulde güllep baslaydı, ol suwıq túskenge shekem dawam etedi. Miyweleri sentyabr ayında pise baslaydı, oktyabr-noyabr aylarında tuqımı teriledi.

Aq cherkezdiń japıraǵınıń uzınlıǵı 3,0 sm deyin bolıp, reńi ashıq kúl reńli boladı. Japıraqları mart-aprel aylarında payda bolıp, avgust, sentyabr aylarına kelip túse baslaydı, oktyabrde tolıq túsip boladı. Aq cherkezdiń jas shaqalarında japıraǵı biraz jasil bolıp, olar ósiwi menen qara reńge kiredi [1].

Aq cherkez tiykarınan Ústirt, Arqa-batis Qızılqum hám Arqa-shıǵıs Qaraqumınıń tómengi eteklerinde keń tarqalǵan.

Salsola paletziana litv. Boyı 4-5 metrge jetetuǵın iri aǵash tárizli ósimlik. Qara cherkez dep atalıwınıń sebebi onıń shaqası hám denesi qara reńde, al aq cherkezde bolsa, denesi hám shaqaları sút reńli aqshıl boladı. Qara cherkezdi sırtqı kórinisi boyınsha aq cherkezden ajratıw qıyas, olardıń biologiyası hám ekologiyası bir- birine júdá úqsas, ol aq cherkezge qaraǵanda tez ósedi, onıń násheleri birinshi jıldıń ózinde 1 metrge shekem jetedi. Aǵashı iri hám singış boladı, sonıń ushın kúshli samaldan keyin onıń shaqaları sınp qaladı.

Qara cherkez júdá tez ósedi, 3-4 jıldıń ózinde belgili ósiw dárejesine jetedi hám kóp massa payda etedi, onıń juwan denesi qıysayıp quwraydı. 6-7 jıldan keyin onıń kóp shaqaları quwrıp qaladı. Qara cherkez jaqtılıqtı súyiwshi ósimlik bolǵanlıqtan onıń tómengi shaqaları sayada qalıp quwraydı. Ol 18-20 jılǵa shekem tirishilik etedi. Bul jasta yarım qurǵaq bolıp, qıysıq hám quwraǵan shaqaları kóp ásirlik daraqlardı esletedi.

Qara cherkez hawa-rayınıń ózgeriwi hám topıraqtıń duzlı quramına júdá tásirshen bolıp keledi. Ol tiykarınan qumda qara seksewil, aq seksewil hám júzgin ósimlikleri menen birge ósedi, onıń qosımsha tamırları qumdı bekkemlew ushın xızmet qıladı. Ol aq cherkez sıyaqlı ot-jemlik ósimlik esaplanadı. Awıl xojalıq sharwa malları tıyler jıl dawamında jese, al qoy-eshkiler bolsa gúz-qıs aylarında súysinip jeydi.

Juǵımlılıǵı 100 kg qurǵaq azıqta báhárde 25 kg azıq birligi, al qısta 33-35 kg azıq birlikke iye boladı. Protein muǵdarı 16,5- 22,9% ke teń [5].

Bul ósimlik tiykarınan tuqım arqalı hám vegetativ (qálemshe arqalı) jol menen kóbeyedi.

Cherkez túrlerin qálemsheden kóbeytkende birinshi jıldıń ózinde jaqsı nátiyje beredi, yaǵnıy otırǵızılǵan qálemsheniń 50% ti ósip rawajlanıp jasil shaqalar payda etedi, vegetaciya dáwiri ishinde 26% ti generativ fazaǵa ótip tuqım beredi, bul hawa-rayı menen baylanıslı, jıl qurǵaq kelgende onıń ósiw rawajlanıwı keskin tómelenp ketedı.

Jazdıń qattı ıssı waqtında kún qum ústin kúshli qızdıǵanda jas ósimliklerdiń tamir moynı shıdamay, ólip qalıw jaǵdayları ushıraydı.

Tábiyyi jaylawlarda aq cherkezler kem ushıraydı. Onıń tiykarǵı komponentleri bolıp aq seksewil, júzgin túrleri, astragal hám basqa ósimlikler esaplanadı.

Tábiyyi hám jasalma shárayatlarda ot-jem ósimlik massasınıń dinamikası onıń jasına hám jıldıń meteorologiyalıq shárayatına baylanıslı boladı. Bir jıllıq ósimlikler hár jılı massalıq ónimdarlıǵı boyınsha meteorologiyalıq shárayatlardıń baylanıslı óz-ara bir-birinen parq qıladı.

Tábiyyi jaylawlardaǵı ortasha zúraát 4,0-5,0 c/ga quraydı, al mádeniy shárayatta ónimdarlıǵı birinshi jılı 1,4 c/ga, úshinshi jılı 9,8 c/ga beredi.

Házirgi waqıtta bul ósimlikler jaylawlardı jaqsılaw ushın keńnen paydalanbaqta, sonlıqtan kóp muǵdardaǵı

туқимлар таярланıp ҳам олardı кең майданларға еғиғе болadı. Натиғеде, Республикamızда черкезлердиң жаңа массивлерин дүзип, олardı шарwashılıқта кең paydalanıwға болadı. Јасалма фитосенозларда тек ғана жақсы туқимлар алып қоймай, олardıң сапасы табиғий шараятта алынған туқимlardan biraz жақсы екенлігі аниқландı. Черкездиң бул өзгешеліктері бизиң Республикamızдиң Қызылқум бөлігінде табиғий жайлауды жақсыларда үлкен аһмийетке ие.

Ақ һәм қара черкез нәллериниң кóгерip шıғıwı mart айыниң екінши декадасынан баслап бақлауға болadı.

Биринши јилі апрел-май аралығында пақалы интенсив óсе баслаыды, вегетация дәуіриниң ақырына келип оның биықлығы 17,5- 47 см ге јетеди [4].

Черкезде бир јилі вегетация дәуіриниң ақырында күшлі тамыр системасы payda болıp, оның тамыры биринши јилі 50-70 см екінши јилі 85-95 см, ал ўшинши јилі 105-130 см тереңлікке јетеди [3].

Еки јилі ақ черкездиң жапырақлары апрел айыниң биринши декадасында жайлау баслаыды. Май айыниң биринши декадасында óсимліктер биықлығы 33 см, оның максимал узинлығы 57 см ге јетеди [1].

Ақ черкездиң барлық түрлері туғры óспейди, ал гeybir түрлері жайылып óседі, егерде бас шақа бир тәрепке јиғılsa, онда ондағы шақалар биықке қарап óседі.

Ўш јилі черкездиң гүллев дәуірінде óсимлік максимал 146 см биықлықке óседі, вегетациялық дәуіриниң аяғында óсимліктің максимал биықлығы 160 см болadı, түп

диаметрі 1,5 см, óсимлік шақалары I-VI тәртиптегі шақаларға ие болadı[4].

Бизиң Арқа-батыс Қызылқум шараятында черкезлердиң гeybir түрлері екінши јилі 3000 нан 6000 данаға дейин туқым береді.

Бизиң изертлеулеримиз бойынша ақ черкез биринши јилі һәрбир түптен орташа 10 гр туқым, екінши јилі 35 гр, ўшинши јилі 100 гр беріуі аниқландı.

Туқымниң абсолют салмағы (1000 дана үшін) 9 гр 256 мг нан 11 гр 500 мг дейин јетеди [4].

Ақ черкез туқымниң óнимдарлығы көпшилiк жағдайда олardıң јасына байланысly болadı, ол туқымниң абсолют салмағы вегетациялық јилларниң метеорологиялық шараятларына күшлі байланысly болadı.

Јууымақлап айтқанда, бизиң Республикamızдиң қумлы шól аймағында ақ черкезди толық егip јетистіріуе болadı, себебі ол қурғақлыққа шıдамлы һәм жоғары óнимдарлы от-жем óсимлік болıp есапланadı. Туқымлардың тек ғана 4-5 ай сақланғанларын егip мақсетке муwapıқ болadı. Һәрбир тоғай хожалығында, туқымларды таярлау, олardı óндіріу дүрис шólкемlestірілсе, ўшинши јилі һәрбир гектардан 29,5 кг туқым алыуға болadı. Ақ черкез фитомелиорант óсимлік есапланadı, соның үшін оны сексеуіл менен биргеликте Арал теңизиниң суы қурыған аймағына тоғайзарлықлар дүзиwде фитомелиорация жұмыстарын жүргізіwде paydalansa, мақсетке муwapıқ болadı.

Адебиеттер

1. Балтабаев М.Т., Ембергенев М. Салсала рiштери Кар.-дiң мәдени шараятта rawajlanıwı//2018-жıl«Једел iсбилерменлик, innovatsiyalıq ideyalar һәм tehnologiyalar dı qollap-quwatlaw jılı» na baғıshlangan «Ilim һәм talım-tarbiyanıń aһmийetli мәseleleri» atamasındaғы Respublikalıq ilimiy teoriyalıq һәм әmeliy konferenciya materialları 5-bólim. –Nókis: 2018. 37-39-b.
2. Балтабаев М.Т., Ембергенев М. Мәдени шараятта Салсала рiштери кар. (черкез)-дiң bioekologiyalıq өзгешeliklerin úyreniw// «Qubla Aral boyı biologiyalıq һәр túrliligin saqlaw, qayta tiklew һәм qorғawdıń ekologiyalıq мәseleleri» atamasındaғы Хalıq aralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları I bólim. –Nókis: 2018. 38-39-b.
3. Балтабаев М.Т., Ембергенев М. Особенности распределения корневой системы Салсала рiштери кар. в культуре. // В международном научном журнале «Молодой ученый» №18 (204), май 2018. Казань: -С.123-125.
4. Балтабаев М.Т., Калбаева С.К. BIO-MORPHOLOGICAL FEATURES OF SALSOLA RICHTERI KAR IN CULTURAL CONDITIONS// ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Referenced & Peer Reviewed Journal) ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 3, March 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492
5. Бахiev А. К вопросу введение в культуру черкеза *Salsola rishteri* кар. в условиях Каракалпакии. В журнале «Вестник» КК филиала Алишер Навоий УзССР, -Нукус: 1980, №4.
6. Ережепов С.Е. Флора Каракалпакии и её хозяйственная характеристика использования и охрана. В книге из-во. «Фан» УзССР, -Ташкент: 1978.

РЕЗЮМЕ. Мақоллада «Оролқум»да фитомелиорация ишларини олиб борish бо'йича yangi ма'lumotlar bayon etilgan. Бу о'симliklarni saksavul bilan birgalikda Орол денгизининг суви қуриған hududiga о'rmonzorlar tuzishda фитомелиорация ишларини олиб borishda foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

РЕЗЮМЕ. В статье представлены новые сведения о фитомелиорационных работах в Аралькуме. Эти растения целесообразно использовать вместе с саксаулом в фитомелиоративных работах в засушливой зоне Аральского моря.

SUMMARY. The article presents new information about phytomeliorative works in Aralkum. It is expedient to use these plants together with saxaul in phytomeliorative works in the arid zone of the Aral Sea.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН АГРОЛАНДШАФТЛАРИДА ТАРҚАЛҒАН ЗАРАРЛИ КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ (Mus, Meriones, Spermophilus) БИОЭКОЛОГИЯСИ

Г.У.Утенова – ассистент ўқитувчи

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтини

А.Ж.Узакбергенов – студент

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети ҳузуридаги Нукус кончилиги институтини

Таянч сўзлар: агроландшафт, биотоп, популяция, ландшафт, экологик, экосистема, кластер, элеватор, кемирувчи, мослашув, сон динамикаси, вегетатив

Ключевые слова: агроландшафт, биотоп, экосистема, мезофилл, антропогенетика, грызун, адаптация, динамика, классификатор

Key words: agrolandscape, biotope, ecosystem, mesophyll, anthropogenetics, rodent, adaptation, dynamics, classifier.

Яқин ўтмишда Амударё тўлиб-тошиб қирғоғига сиғмай, Орол денгизига қуйиб турган даврда Қуйи Амударё дельтаси, экин зонасининг ранг-баранг гўзал бой табиати, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси қўшни давлатларнинг ҳам олимларини раҳбарларининг қизиқишини уйғотган ҳудуд бўлган.

Ўтган асрнинг 50-60 йиллари [1:19, 2:89, 3] олимлар ҳудудимизнинг судралиб юрувчилари, қушлари, сутемизувчилар фауна жамланмаси тадқиқотига катта ҳисса қўшган олимлар ҳисобланади.

Афсуски, кейинги қисқа давр ичида (1963-2020 й) Амударё суви тортилиб, дунёнинг энг катта

қўлларининг бири бўлган Орол денгизининг қуриб қолиши натижасида атроф муҳитда ўзгарувчан ҳолат юз бера бошлади. Ўсимлик ва ҳайвонот дунёсида бўлган ва давом этаётган ўзгаришлар катта-катта ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни юзага келтирди [4].

Ушбу ўзгарувчан муҳит ҳолатида, бу талофотдан халқни омон сақлаб, олиб чиқиш бўйича Республикамызда тил билан айтиб етказа олмайдиган чоралар амалга оширилмоқда.

1951-1952 йиллари Қуйи Амударё дельтасида нормал ҳолат даврида қўллар сувга тўлиб чайқалган