

UDK 576.895
QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA QAMIS PISHIGI FELIS CHAUS NEMATODA KLASI
GELMINTOFAUNASI

Kongratbaeva Paruaz Oserbaevna – student

pkongratbaeva@gmail.com

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika instituti

ГЕЛЬМИНТОФАУНА КЛАССА НЕМАТОД FELIS CHAUS КАМЫШОВОЙ КОШКИ
В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Конгратбаева Паруаз Осербаевна – студент

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

HELMINTOFAUNA OF THE FELIS CHAUS NEMATODA CLASS
IN THE CONDITIONS OF KARAKALPAKSTAN

Kongratbaeva Paruaz Oserbaevna – student

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Tayanch so'zlar: gel'mint, tip, sinf, oila, avlod, oraliq xo'jayin, zooantroponoz.

Rezyume. Qamush mushugida 14 turdagi nematoda sinfiga mansub gel'mintlar ro'yxatga olindi. Ular 1 tip, 1 sinf, 6 turkum, 10 oila, 11 avlodga tegishli ekenligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqodlar natijasida, tekshirilgan 19 nusxa dala mushuklarida 14 turdagi nematoda sinfiga mansub gel'mintlar bilan zararlanganlik kuzatildi.

Ключевые слова: гельминт, тип, класс, семейство, род, промежуточный хозяин, зооантропоноз.

Резюме. У тростниковой кошки зарегистрировано 14 видов гельминтов, относящихся к классу нематод. Они относятся к 1 типу, 1 классу, 6 отрядам, 10 семействам, 11 родам. В результате исследований у 19 исследованных образцов полевых кошек наблюдалось заражение гельминтами, относящимися к 14 видам класса нематод.

Key words: helminth, type, class, family, genus, intermediate host, zoonanthroposis.

Summary. 14 species of helminths belonging to the class of nematodes were recorded in the reed cat. They belong to 1 type, 1 class, 6 orders, 10 families, and 11 genera. As a result of the research, 19 field cats were infected with 14 species of helminths belonging to the class of nematodes.

Kirisiw. Sońǵı jılları Qaraqalpaqstan shárayatında qamis pishıǵı *Felis chaus* Gueldenstaedt, 1776 sanınıń keskin asıwı kózge taslanbaqta. Qamis pishıǵı *F.chaus* tiykarınan xalıq jasawshı aymaqlarǵa jaqın aralıqlarda keń tarqalǵan jabayı jırtqısh sút emiziwshı haywanlardan sanaladı. Demek, qamis pishıǵınıń bunday jasaw forması úy haywanları menen gelmintoz keselliklerdiń almasıwında tiykarǵı buwın wazıypasın atqaradı. Úy haywanları bolsa adamlar menen eń jaqın aralıqta bolǵanlıǵı sebepli, xalıq jasawshı aymaqlarda qáwıpli antropozoonoz invaziýalarınń tarqatıwshısı hám topraqlardı pataslawshı tiykarǵı derek bolıwı sózsiz. Úy hám jabayı sút emiziwshı haywanlar gelmintlerdiń tiykarǵı xojayınleri esaplanıp, gelmintlerdiń jınısıy er jetken hám lichinkaları adamlarda, úy haywanlarında hámde quslarda parazitlik etedi [1, 4].

Qamis pishıǵı *F.chaus* adamlar hám úy haywanlarında parazitlik etiwshı kóplep gelmint túrleriniń tiykarǵı xojayınlerinen biri esaplanadı. Sonıń ushın da qamis pishıǵı *F.chaus* gelmintofaunasın úyreniw házirgi kúnde ilimiy hám ámeliy tárepten úlken áhmiyetke iye.

Izertlew materialları hám usılları. Alıp barılǵan izertlew jumısları tiykarınan 2024-2026-jıllar dawamında hár túrli máwsimlerde belgilengen marshrutlı baǵdarlar tiykarında Qaraqalpaqstan Respublikasınıń hár túrli aymaqlarında alıp barıldı. Izertlewler dawamında akademik Skryabinniń tolıq hám tolıq bolmaǵan gelmintologiyalıq jarıp kóriw usılı menen 39 nusxa qamis pishıǵı *F.chaus* tekserildi hám olarda 19 pishıqlar gelmintler menen zıyanlanganı belgili boldı 48,7% [6]. Anıqlanǵan gelmint túrleri klasslarǵa ajratılıp, trematoda, cestoda hám akantocéfala klasslarına tiyisli gel'mintler 70% hám 96% spirtte, nematoda klasına tiyisli gelmint túrleri bolsa Barbagallo suyıqlıqlarında fiksaciyalandı hám etiketkalar

jabıstırılıp barıldı hám de gelmint túrlerin anıqlaw jumısları Ajiniyaz atındaǵı NMPI Eksperimental biologiyalıq izertlewler laboratoriyasında ámelge asırıldı. Belgilengen usıllar hám ilimiy maǵlıwmatlar járdeminde gelmintlerdiń túrleri anıqlandı [1, 5, 6].

Nátıyjerler hám talqılaw. Qaraqalpaqstanınıń hár túrli aymaqlarında alıp barılǵan izertlewlerimiz nátiyjerlerine kóre, gelmintologiyalıq tekserilgen 39 nusxa qamis pishıǵı *F.chaus* 19 nusxası gelmintler menen zıyanlanganı gúzetildi 48,7%. Olarda 14 túr nematoda klasına tiyisli bolǵan gelmintler dizimge alındı, 1 tip, 1 klass, 6 otrıad, 10 tuqımlas, 11 tuwısqa tiyisli ekeni belgili boldı [1].

Nemathelminthes Schneider, 1873 tip

Nematoda Rudolphi, 1808 klass

Trichocephalida Skrjabin et Schulz, 1928 otrıad

Capillariidae Neveu-Lemaire, 1936 tuqımlas

Thominx Dujardin, 1845 tuwıs

1. Thominx aerophilus Creplin, 1839

Tiykarǵı xojayın: qamis pishıǵı *F.chaus*

Lokalizaciya: traxeya hám bronxlar.

Aralıq xojayın: jawın qurtları [4].

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamis pishıǵınan 2-5,1 % zıyanlanganı gúzetildi.

Invaziya intensivligi: 1 - 3 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Diectophymida Skrjabin, 1927 otrıad

Diectophymidae Railliet, 1915 tuqımlas

Diectophyma Collet-Meygret, 1802 tuwıs

2. Diectophyma renale Goeze, 1782

Tiykarǵı xojayın: qamis pishıǵı

Lokalizaciya: bóteke, qarın boslıǵı.

Aralıq xojayın: E.M.Karmanovanıń [2]
maǵlıwmatlarına qaraǵanda oligoxetlar aralıq xojayın, balıqlar rezervuar xojayın wazıypasın atqaradı.

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 5-7,7% zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 2-3 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Strongylida Railliet et Henry, 1913 otrıad

Ancylostomatidae Looss, 1905 tuqımlas

Ancylostoma Dubinin, 1843 tuwıs

3. *Ancylostoma caninum* Ercolani, 1859

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke hám juwan ishekler.

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamıs pıshıǵınan 2-5,1 % gelmintler menen zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 2-5 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Uncinaria Froelich, 1789 tuwıs

4. *Uncinaria stenocephala* Railliet, 1854

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke hám juwan ishekler.

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 4-10,2 % zıyanlanganı gúzetildi.

Invaziya intensivligi: 4-18 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Crenosomatidae Schulz, 1951 tuqımlas

Troglostrongylus Vevers, 1922 tuwıs

5. *Troglostrongylus badanini* Muminov, 1964

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: bronxlar.

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 2-5,1 % zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 2-4 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdár'ya deltası.

Ascaridida Skrzabin et Schulz, 1940 otrıad

Ascaridae Baird, 1853 tuqımlas

Toxascaris Leiper, 1907 tuqımlas

6. *Toxascaris leonina* Linstow, 1902

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: asqazan, jınıshke ishek.

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamıs pıshıǵınan 9-23,1 % zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 4-56 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Anisakidae Skrzabin et Karokhin, 1945 tuqımlas

Toxocara Stiles, 1905 tuwıs

7. *Toxocara canis* Werner, 1782

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: asqazan, qarın boshıǵı, jınıshke hám juwan ishekler.

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 11-28,2 % gel'mintler menen zıyanlanganı gúzetildi.

Invaziya intensivligi: 3 - 91 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

8. *Toxocara mystax* Zeder, 1800

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke ishek, asqazan hám qarın boshıǵı.

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamıs pıshıǵınan 10-25,6 % zıyanlanganı gúzetildi.

Invaziya intensivligi: 3-43 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Oxyurida Skrzabin, 1923 otrıad

Subuluridae Yorke et Maplestone, 1926 tuqımlas

Oxyntema Linstow, 1829 tuwıs

9. *Oxyntema numidica* Seurat, 1915

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke ishek.

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 6 - 15,3 % zıyanlanganı.

Invaziya intensivligi: 4-15 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Spirurida Chitwood, 1933 otrıad

Spiruridae Oerley, 1885 tuqımlas

Vigisospirura Petrow et Potekina, 1953 tuwıs

10. *Vigisospirura potekhini* Petrow et Potekina, 1953

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: asqazan hám qızıl ónesh.

Aralıq xojayın: [1, 5] maǵlıwmatlarına qaraǵanda qara deneli qonızlar (*Blaps fausti bactriana*, *Trigonocelis gemmulata*, *T.ceromatica*, *Pachyscelih banghaasi*, *P.Laevicollis* h.b.) hám tezek qonızları (*Scarabaeus sacer*) aralıq xojayın wazıypasın atqaradı.

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 2 - 5,1 % zıyanlanganı.

Invaziya intensivligi: 2 - 4 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Physalopteridae Leiper, 1908 tuqımlas

Physaloptera Rudolphi, 1819 tuwıs

11. *Physaloptera praeputiale* Linstow, 1888

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: asqazan hám jınıshke ishek.

Aralıq xojayın: hár túrdegi qonızlar [1, 5].

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 6 - 15,3 % zıyanlanganı gúzetildi.

Invaziya intensivligi: 4-17 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdár'ya del'tası.

12. *Physaloptera sibirica* Petrow et Gorbunow, 1931

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: asqazan hám jınıshke ishek.

Aralıq xojayın: hár túrdegi qonızlar [3].

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamıs pıshıǵınan 5-12,8 % zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 3-21 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdárya deltası.

Rictulariidae Railliet, 1916 tuqımlas

Rictularia Froelich, 1802 tuwıs

13. *Rictularia affinis* Jagerskiold, 1904

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke hám juwan ishek.

Aralıq xojayın: qonızlar, tarakanlar [5].

Invaziya ekstensivligi: tekserilgen 39 qamıs pıshıǵınan 5 - 12,8 % zıyanlanganı anıqlandı.

Invaziya intensivligi: 3-17 nusqa.

Anıqlanǵan ornı: Ámiwdár'ya deltası.

14. *Rictularia cahirensis* Jagerskiold, 1904

Tiykargı xojayın: qamıs pıshıǵı

Lokalizaciya: jınıshke hám juwan ishek.

Aralıq xojayın: qonızlar, tarakanlar [5].

Invaziya ekstensivligi: tolıq gelmintologiyalıq tekseriwden ótkerilgen 39 qamıs pıshıǵınan 4-10,2 % zıyan.

Invaziya intensivligi: 2-11 nusqa.

Anıqlanğan ornı: Ámiwdárya deltası.

Izertlewler nátiyjelerine kóre Qaraqalpaqstan Respublikası Ámiwdárya deltası aymaqlarınan jabayı jırtqısh sút emiziwshi qamıs pıshıqları ortasında nematoda klasına tiyisli bolğan 14 túrdegi gelmintler dizimge alınğan bolıp, olar 1 tip, 1 klass, 6 otrıad, 10 tuqımlas, 11 tuwısqa tiyisli ekeni belgili boldı. Olardan 5 túri biogelmintler toparına tiyisli bolsa qalğan 9 úri giogel'mintler toparına tiyisli ekeni belgili boldı [1].

Biogelmintlerdiń rawajlanıw ciklerinde aralıq xojayın wazıypasın cikloplar, oligoxetlar, buwın ayaqlılardıń hár túrli wákilleri, saqıynalı qurtlar, balıqlar hám hár túrdegi qan sorıwshı shıbınlar atqaradı [1].

Juwmaq. Qaraqalpaqstanda Ámiwdárya deltası aymaqlarında qamıs pıshıqları ústinde gelmintologiyalıq tekseriwler birinshi márte ámelge asırıldı. Qamıs pıshıǵı, úy hám jabayı sút emiziwshi haywanları arasında, sonıń ishinde úy pıshıqları ushın kóplegen gelmint invaziýalarınń tiykarǵı qozǵatıwshılarınan biri esaplanadı [1, 5].

Bunday jaǵdaylarda adamlar sanitar gigienalıq qaǵıydalarǵa tolıq ámel etiwı lazım, dep esaplaymız. Úy pıshıǵın saqlaytuǵın hár bir xojalıq óz waqtında pıshıqlardı veterinariya kóriginen ótkerip turıwı tiyis, sonda adamlar hám úy haywanlarınń gelmint infekciyaları menen zıyanlanıwınıń belgili dárejede aldın alǵan boladı [1, 5, 6].

Ádebiyatlar

1. Бердибаев А.С. Қорақалпоғистон йирткич сүт емизувчилари (Mammalia: Carnivora) гельминтлари.: Дисс. ... био. фан. фалсафа. докт. (PhD) – Нукус: 2021.
2. Карманова Е.М. Диоктофимиден животных и человека и вызываемые ими заболевания. «Основы нематодологии». 20. – Москва: «Наука», 1968.
3. Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых. – Ташкент: «Фан», 1983.
4. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. – Москва: «Колос», 1984.
5. Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. – Москва: «Наука», 1977.
6. Скрыбин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – Москва: МГУ, 1928.