

**QARAQALPAQSTAN JAĞDAYÍNDA POPULUS ARIANA DODENIŇ
BIO-EKOLOGIYALÍQ ÓZGESHELİKLERI**

M.T.Baltabaev – biologiya ilimleriniń kandidatı, docent

A.Abilova – talaba

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Tayanch soʻzlar: vegetatsion davr, novda, barg, poya, kurtak, urugʻning unishi, gul, meva bandi, ildiz tizimi, vegetativ koʻpayish, urugʻchi va changchi, chang donacha, vegetativ va generativ kurtak, gullash, kushala.

Ключевые слова: вегетационный период, побег, листья, стебель, почка, прорастание семян, цветок, плодоножка, корневая система, вегетативное размножение, тычинка, пестик, пыльцевые зерна, вегетативные и генеративные почки, цветение, серёжка.

Key words: vegetation period, shoot, leaves, stem, bud, swelling seeds, flower, peduncle, root system, vegetative reproduction, stamen, pistil, pollen grains, vegetative and generative buds, flowering, catkin.

Torańǵıllar **Salicaceae** tuqımlasınıń **Populus L.** tuwısına kiredi [4]. Bul tuwısqa Ózbekstanda 17 túr kiredi, Qaraqalpaqstanda terektiń tórt túri ushırasadı. Bizde torańǵıllardıń eki turi: *P. ariana* hám *P. pruinosa* tarqalǵan. Qaraqalpaqstan aymaǵında toǵaylardaǵı tarqalǵan aǵash deneli ósimliklerdiń eń baslı hám turaqlı wákili torańǵıl bolıp tabıladı.

«Orta Aziya miynetleri anıqlaǵışı»nıń Qaraqalpaqstan ushın bir qatar avtorlarınıń sońǵı miynetlerinde torańǵıldıń *P. pruinosa* hám *P. euphratica* túrleri kórsetilgen, tiykarındabiziń floramızda *P. pruinosa* hám *P. ariana* ósedi (1-súwret).



1-súwret. *P. ariana*-nıń ulıwma kórinisi.

Bul túrler topıraqtıń ústińgi qatlamınıń duzlılıǵına, ondagı ıǵallılıqtıń kemligine hám suwıqqa shıdamlılıǵı menen ajıralıpturadı. Tábiyǵıy sharayatlar hám násilshilik ózgeshelikleriniń qalıplesiwine bola torańǵıl suwsızlıqqa hám duzlılıqqa shıdamlı jańa terek túrlerin jaratıw selekcıyası ushın oǵada kerekli obyekt bolıp esaplanadı [3].

Bul túr gıbridlestiriw hám duzlangan jerlerdi kógalandı- rıw ushın eń bahalı material bolıp esaplanadı.

Ulwma tarqalıwı – Iran, Kavkaz, Batis Qıtay hám Oraylıq Aziya, al Ózbekstanda Zarafshan, Ámiwdárya, Murǵab, Tedjen dáryalarınıń jaǵaları.

Bul túr, tiykarınan, Qaraqalpaqstan aymaǵında Tallıq, Baday toǵay, Shaǵal, Nazarxan, Bekbay, Shoqay, Samanbay, Esbergen shıǵanaq, Shortanbay, Shaǵal toǵay, Nurım túbek toǵaylarda ushıraydı. Torańǵıldıń vegetaciyalıq dáwiri mart ayınıń ekinshi dekadasinan

baslanadı, yaǵnıy búrtik jaradı. Mart ayınıń aqırına kelip, ğumshalaydı. Aprel ayınıń birinshi dekadasında dáslepki gúller ashıldı, shaqalar ush shıǵara baslaydı. Gúllew apreldiń ortalarına shekem dawam etedi.

P. ariana torańǵılınıń shaqa japıraqlarında 10-16 dana ushlı iymek tisshelei boladı, nayshası tegis, túynek sabaqları qısqa, gúl pópegi hám miywe sabaqlarında uzın, dúziw tükleri boladı. Bul túr *P. diversifolia* ǵa júdá uqsas bolıp, tek ǵana tegis nayshası menen ajıraladı. Japıraqlarınıń uzınlıǵı 2,7-5,5 sm, eni 4-6 sm, dóńgelek úsh múyeshli, qabırshaqlı, túbi sina tárizli yamasa dúziw boladı, ushında 10-16 sheti súyir, bir ólshemdegi iymek tisshelei bar, tıp jaǵında eki bezshe bolıp, olar ashıq jasıl reńli, eki tárepi de tegis. Japıraq sabaqlarınıń uzınlıǵı 3-4 sm, jalpaq yamasa domalaq, tegis boladı. Shaq japıraqlarınıń uzınlıǵı 6-1 sm, eni 1,3-1,5 sm, nishterli, eki-úsh sezilerli tisshelei boladı, eki tárepi de ashıq-jasıl boladı. Atalıq búrtikleri analıqqa qaraǵanda irilew bolıp, uzınlıǵı 9 mm, reńi sarı-jasıl. Qızıl-qońır reńli kóp guli (21-24 gul). Gúl pópegi hám sabaqlarında sarǵısh tükleri bar, tükli sabaqlardaǵı gullerdiń uzınlıǵı 1,5-2 mm. Shań qaltalarınıń sanı 20, uzınlıǵı 1,3 mm, qalınlıǵı 1 mm, uzınsha ashıq qızıl reńli bolıp, sabaǵınıń uzınlıǵı 1,2 mm boladı. Miyweleriniń uzınlıǵı 1,5 sm, máyek tárizli, jıńishke máyek tárizli, eki jaqlawlı. Aǵashı sarı yadroli, qattı boladı.

Apreldiń úshinshi dekadasında japıraqlardıń jasıl konusı payda boladı. Japıraqları mayda, endi ǵana shaqada búrtik ashılǵannan keyin payda boladı.

May ayınıń aqırına kelip, japıraqlar belgili ólshemge jetedi, Búrtikler payda boladı, biraq olar ásten ósedi, reńi jasıl dúmpek túrinde boladı. Shaqalar qatayadı (ósip atırǵan joqarǵı bóleginen basqa). Iyun ayınıń baslarında búrtikler normal razmerge keldi, qabırshaqları jasıl reńli boladı.

Shaqanıń uzınına ósiwi toqtaydı, ushında búrtik payda boladı, shaqa ele qatayǵan joq hám toqıma menen tolıq qaplanbaǵan. Barlıq japıraqlar normal razmerge jetedi. Olar iyuldiń ortalarına shekem dawam etedi. Shaqa qatayadı hám qaplawshı toqıma menen qaplanadı. Búrtikler normal razmerge jetip, qabırshaqları qatayadı, bul dáwir oktyabrdiń ortalarına shekem dawam etedi.

Birdey topıraq-ıqlım sharayatlarında bul processler *P. ariana* túrinde *P. pruinosa* túrine qaraǵanda erte baslanadı.

Japıraqlardıń túsiwi oktyabrdiń aqırı hám noyabr ayınıń basına tuwra keledi. *P. ariana* túrinde *P. pruinosa*ǵa salıstırǵanda erte baslanadı.

Biz úyrengen *P. ariana* torańǵıl túrinde japıraq túsiw dáwiri 26-27 kún dawam etedi. Biraq japıraqlardıń tusiwi hawa rayına baylanıslı hár jılı ózgerip turıwı múmkin. *P. ariana* túrinin vegetaciya dáwiri 239-242 kún bolsa, al *P. pruinosa* túrinde–244-249 kúnge teń, bul kórsetkish *P. pruinosa* túrine salıstırǵanda bir qansha qısqa ekenligin kóremiz, sebebi *P. ariana* kóbirek qurǵaq jerlerde keń tarqalǵan.

Gúllew hám miywelew. Toráńǵıldın gúllewı hám miywelewı Qaraqalpaqstan sharayatında vegetaciya dáwiriniń tórtinshi jılınan baslanatuǵınlıǵın kóremiz [1].

Torańǵıldın shaqa jayıp rawajlanıwı japıraq shıǵarıwı menen bir waqıtta baslanadı.

Gúllewdiń baslanıwı torańǵıldın túrine hám jıldıń meteorologiyalıq jaǵdayına baylanıslı boladı. Dáslepki ashılǵan kúnleri urǵashı *P. ariana* gúl pópeginde gúllderdiń jetilisiwi birdey emes tómengi 5-6 gúl joqarıdaǵılarına qaraǵanda irilew hám qalıńıraq boladı. Gúl pópekleri ashılǵannan keyin úsh-tórt kúnnen soń tómengi gúlles ashıladı. Dáslep ashılǵan gúlles gúl pópegindegi gúllderdiń ulıwma sanınıń 20% quraydı. Keyingi 2-3 künde birinshi kúni qansha gúl ashılǵan bolsa, sonshelli gúl ashıladı. Bunnan keyin de usılay ashılıw dawam etedi. Bir gúl pópegindegi gúllew 8-10 kún dawam etedi (2-súwret).

Birinshi sırtqı qabıq búrtik ústin jawıp turadı, reńi qızǵısh-aq, jumalaq, ishki beti jabısqaq, qızǵısh-sarı reńde hám onda jabısqaq zat boladı. Ekinshi qabıq – uzınlıǵı 10 mm, eni 3,1 mm, jıltıraq, ashıq sarı, qızıl, túbi jasıl-sarı reńli, ushı ekige ayırılǵan, qabıq dúńki túrinde boladı.

Úshinshi qabıq uzınlıǵı 1 mm, eni 3,1 mm, qattı, jıltıraq, sırtqı tárepi ashıq sarı reńli juqa plenka menen qaplangan, reńi qızǵısh-sarı, túbi jasıl-sarı, forması sozınqı, azǵana ishke oyılǵan boladı.

P. ariana túrinin búrtikleri shaqalarda izbe-iz jaylasadı, shaqaǵa jabısqaq halda jaylasadı, onıńsanı 6-12 jetedi. *P. ariana* torańǵılında generativ búrtik shıǵarıw iyuń ayında ótedi. *P. ariana* torańǵılınıń erkek gúlli búrtikleri 10 iyulde, al urǵashı gúlli búrtikler 1 iyulde qalıpleseı. Solay etip, gúl búrtikleri bárqulla eki jıllıq boladı. Búrtik, tiykarınan, úsh qabıqtan turadı, reńi qızǵıshsarı, onın ólshemi uzınlıǵı 10 mm, eni 4 mm.



2-súwret. *P. ariana* nıń gul popegi (serejka)


Ishki tárepi juqa jıltır plenka menen qaplangan. Gúli tegis, analıq hám atalıq boladı. Bir gúlde 10-15 atalıq boladı (3-súwret). Ol shań qaltadan kelte hám qalıń atalıqlardan turadı (4-súwret). Shań qaltalar qızıl-kókshil reńli. Atalıq gúlles kishkene kóp sanlı reńsiz jolaqlar menen qaplangan boladı. Urǵashı gúllesde analıqlar sanı 18-28 ge jetedi. Analıqta jayılǵan naysha boladı, analıq awzı bir neshe bólekke bólingen.

Usılayınsha shań qaltasınıń ashılıwı hám atalıqtıń jayıwı gúl pópeginin tómengi gúllesinde baslanadı hám onıń orta hám joqarǵı bólimlerinde jaylasqaq gúllesde dawam etedi.


Torańǵıldardıń gúllewı 20 kúnge shekem dawam etedi. Shańlanıw hám tuqımlanıwdan keyin gúllderdiń analıq awızları qarayıp quwraydı, al naysha diywalları túynek jaqlawına aylanadı.

Túyekte tuqımlar payda boladı hám olar 105-120 kúnnen keyin pisip jetilisedi.

Bir túyektegi tuqımlar sanı 60 tan 151 ge shekem jetedi.



3-súwret. *P. ariana* nıń atalıq gúli.



4-súwret. *P. ariana* nıń atalıq ayırım gúli.

Gúl pópeginin ashılıwına hám gúllewine ósimliktiń ósip turǵan ornı da belgili tásir etetuǵınlıǵı málim boldı, atap aytqanda, Doslıq kanalı boyındaǵı Shaǵal toǵay aymaǵında qurǵaq topıraqlı jerlerdegi *P. ariana* torańǵılınıń erte gúllewın baqladıq.

Suw basqaq, jer astı suwları joqarı hám topıraq ıǵal bolǵan jerlerdegi aǵashlardıń keshirek gúlleytuǵının baqladıq. Bul jerlerdegi toǵayzarlarda gúllep turǵan daraqlardı uzaq waqıt dawamında baqlaw múmkin, bul process bolsa gúl pópeklerindegi gúllderdiń basım kópshiliginiń shańlanıwına hám miyweleriniń kóp bolıwına járdem beredi.

Torańǵıldın kóbeyiwi. *P. ariana* torańǵılı tuqımnan hám vegetativ jol menen: tamır nartshaları, sonday-aq, tamır qálemsheleri arqalı kóbeyedi.

P. ariana-nıń tuqımnan kóbeyiwı tábiyiy hám mádeniy sharayatta da keń tarqalgan. Torańıl tuqımı 105-120 kúnde pisip jetilisedi. Túyneklerdiń ashılıwı menen olar tolıǵı menen yamasa bir bólegi sarǵayadı. Geypara jaǵdaylarda túyneklerdiń ashılıwı hám tuqımlardıń shashılıwı gúl pópekleriniń tómengi bóliminen baslanıp, 2-6 kúnge shekem dawam etedi.

Torańıldıń tuqımnan kóbeyiwı Ámiwdáryanıń qayır jerlerinde, atap aytqanda, Shadlı awıl aymaǵında baqlandı, bul jerlerde tuqımnan kógergen nálsheleler lenta tárizli bolıp ósip shıǵadı. Biz tuqımnan kóbeyiw boyınsha tájiriye ótkermedik. Laboratoriya sharayatındaǵı topıraқта tuqımlardıń 70% kógerip shıǵadı [5].

Torańıldıń vegetativ kóbeyiwı. Bizler torańıldıń (P. ariana Dode.) vegetativ kóbeyiwın Shaǵal toǵayında tábiyiy sharayatta úyrendik.

2022-2023-jılları biz shaqadan shúllikler tayarlap tájiriye ótkerdik. Bunıń ushın uzınlıǵı 35-40 sm bolǵan 100 dana shaqalar kesip alınıp, salma boylarına shansıldı. Eń kóp tarqalgan kóbeyiw túri – bul tamırları arqalı kóbeyiw bolıp esaplanadı. Tamırları arqalı kóbeyiw, tiykarınan, suw alma oypatlarda kóriwge boladı. Sonday-aq, tamır nartshalarınan kóbeyiw suwsız jerlerde de kózge taslanadı.

1-keste. Torańıldıń shúllikten kóbeyiwı

Egilgen sáne	Egilgen shúllikler sanı	Hár ayda ónip shıqqan shúllikler sanı					Ónip shıǵıwı, % esabında
		10.05	15.06	15.07	15.08	15.09	
21.03.2023	100	26	25	23	20	16	26%

Ádebiyatlar

1. Айтбаев Қ.А., Балтабаев М.Т. Цветение и плодоношение двух видов. // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – Нукус: 1991. №3. -С. 34-38.
2. Baltabaev M.T., Kadirov R.K. Biological features of populus ariana Dode. in the conditions of the south Aral. // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5 | Issue: 10 | October 2020. – Peer Reviewed Journal 337-340.
3. Бахiev А.Б., Трешкин С.Е., Кузьмика М.В. Современное состояние тугаев Каракалпакстана и их охрана. – Нукус: 1995. 4-35-б.
4. Коровин О.Н., Бахiev А.Б., Таджитдинов М.Т., Сарыбаев Б.Ш. Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма. – Ташкент: «Фан», 1982. –С.82.
5. Усманов А.У. К биологии вегетативного размножения турангиловых тополей. – Ташкент: «Фан», 1961, № 5. –С. 3-35.

REZYUME. Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston sharoitida Populus ariana Dode. Turning biologic va ekologik xususiyatlari o'rganilgan. Tadqiqotda daraxtlarning vegetatsiya davri, gullash va mevalanish jarayonlari, tuproq va iqlim sharoitlariga moslashuvi, shuningdek, vegetative va urug' orqali ko'payish imkoniyatlari tahlil qilingan. P. ariana turi tuproq sho'rlanishi va namlik yetish movchiligiga chidamliligi bilan ajralib turadi va yashil maydonlarni ko'kalamzorlashtirish uchun qimmatli material hisoblanadi.

РЕЗЮМЕ. В данной статье изучены биологические и экологические особенности вида Populus ariana Dode. в условиях Каракалпакстана. В исследовании рассматриваются вегетационный период деревьев, процессы цветения и плодоношения, адаптация к почвенно-климатическим условиям, а также возможности вегетативного и семенного размножения. Вид P. ariana отличается устойчивостью к засоленности почвы и дефициту влаги, что делает его ценным материалом для озеленения территорий.

SUMMARY. This article examines the biological and ecological characteristics of Populus ariana Dode. under the conditions of Karakalpakstan. The study analyzes the vegetation period, flowering and fruiting processes, adaptation to soil and climatic conditions, as well as the possibilities of vegetative and seed propagation. The P. ariana species is distinguished by its resistance to soil salinity and moisture deficiency, making it a valuable material for landscaping and afforestation.