

MÁDENIY SHÁRAYATTA KEYREUKTÍN BIO-EKOLOGIYALÍQ ÓZGESHELİKLERİ

M.T.Baltabaev – *biologiya ilimleriniń kandidati*

M.Qarlibaeva - *biologiya oqıtıw metodikası tálim baǵdarınıń 2-kurs studentı*

Ajiniyaz atındaǵı Nokis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Tayanch so'zlar: yuvenil davr, ildiz tizimi, yashil massa, meva, gipokotil, haqiqiy yaproq, g'uncha, urug' qanotchasi, pobeg, gul, urug' ulushi, generativ pobeg, vegetatsiya, fenologiya, ontogenez.

Ключевые слова: ювенильный период, корневая система, зелёная масса, плод, гипокотиль, настоящий лист, бутон, крылатки семени, побег, цветок, семядоля, генеративный побег, вегетация, фенология, онтогенез.

Key words: juvenile period, root system, green mass, fruit, hypocotyl's hook, genuine leaf, bud, seed samara, sprout, flower, seed part, reproductive sprout, vegetation, phenology, ontogenesis.

Keyreukti birinshi mártebe Gmelin [2], jazadı hám onı Solsola orientalis dep ataydı. Keyin bul ósimlikti Pallas [2], Solsola rigida dep ataydı, bul atama kóp waqıtlarǵa shekem saqlanadı. V.P.Bochantsev [2], onıń birinshi atı, yaǵmıy Solsola orientalis dep atawdı usınadı, al Solsala rigida onıń sinonimi, bizde bul pikirdi qollaymız. P.A.Baranov [2], V.K.Vasilevskaya [2], S.Yu.Rojanovskiylar [2], kserofit strukturaǵa iye ósimliklerde polisad toqımalar jaqsı rawajlanadı, japıraq betin qorǵaydı, sonlıqtan olardıń qurǵaqlıqqa shıdamlılıǵı kúshli bolatıwıńnıń kórsetedi.

Keyreuktıń sapalı ot-jemlik ósimlik ekenligi, ol qoyeshkiler hám iri qaramallar ushın jıl dawamında jelinetuǵın tiykarǵı ot-jemlik ósimlik. Keyreuktıń usı qásiyetlerin Muravlyanskiy [1], Larin [1], ham t. basqalar Burigin [2], ham t.b. jaqsı úyrengen. M.M.Sovetkina [2], O.İ.Morozova [2], İ.V.Larin [2], hám t.b. kórsetken maǵlıwmatları boyınsha keyreuktıń jelinetuǵın bólimlerinde (japıraq, mayda shaqa, gúlli hám miywesi) 17,4% kul, 9,7% protein hám kletchatka 23,7% bar ekenligi anıqlanǵan.

Keyreuk (Salsola orientalis S.G.Gmel.) – soralar tuqımlasına kiretuǵın yarım puta ósimlik bolıp, onıń boyı 35–55 sm, vegetaciyalıq dáwiri uzaq (250–254 kún) hám 20–30 tirishilik etedi. Keyreuk túbinen baslap kúshli shaqalanǵan, onda sırtı tükli qıysıq shaqalar jaylasqan. Tamır sisteması universal tipke iye bolıp, onıń uzınlıǵı 6–7 m. tereńge jetedi (1-súwret).



1-súwret. Keyreuktıń ulıwma kórinisi

Ósimliktiń tamır sisteması ekologiyalıq ortalıq sıpatında topıraqqa baylanıslı awqatlıq zatları ózlestiriw hám sıñırıwde ayırıqsha wazıypanı atqaradı. Topıraq jaǵdayınıń ózgeriwi menen ósimliktiń jer astı organı, onıń jer ústi bólimine qaraǵanda kúshli ózgeriske ushıraydı. Tamır sisteması hár qıylı topıraq sharayatında ósimliktiń usı yamasa basqa tirishilik formasına sáykes suwlı-mineral awqatlanıwın belgili dárejede támiyinleydı.

Ámiwdárya rayonı Berdaq fermerler birlespesi aymaǵında mádeniy shárayatta keyreuktıń bio-

ekologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw boyınsha tájiriyebe ótkerildi.

Biziń shárayatta keyreuk tuqımınıń kógerip shıǵıwı mart ayınıń úshinshi on kúnligine tuwra keledi. Tuqım úlesi jınıshke sopaq joqarı tárepı sarı jasıl biraz salbıraǵan, al tiykarı azıraq tómén iyilgen. Tuqım úlesiniń uzınlıǵı 7 mm, eni 2 sm gipokotil uzınlıǵı 6-7 mm. Bul waqıtta keyreuktıń bas tamırı topıraqqa 9-10 sm tereńlikke jetedi, 3-5 sm tereńlikte mayda qaptal tamırlar payda bola baslaydı [1]. Keyreuktıń yuvenil dáwirinde tamır sistemasınıń intensiv rawajlanıwın kóriwge boladı, bul qásiyet qurǵaq shárayatta ósip rawajlanıwına múmkinshilik tuwdıradı.

Iyun ayınıń aqırında ósimliktiń biyikligi 24 sm jetip, al tamır uzınlıǵı 30 sm hám qaptal tamır 5 sm ge jetedi.

Keyreuk birinshi jıldıń ózinde gúllep tuqım beretuǵın jaǵdayların Qubla-batis Qızılqumda R. Nugmanova hám Ustiyurt sharayatında A.Allaniyazovlar (1980) anıqlaǵan.

Ustirt sharayatında keyreukte gúllew dáwiri bolǵanı menen onıń miyweleri tolıq pispeytuǵınlıǵı anıqlanǵan [3].

Hár bir japıraq qoynında haqiqiy japıraq payda boladı, olar tiykarman 3-4 shi tártiptegi shaqalar jaylasqan. Gumshalaw may ayınıń basında baslanıp, bul waqıtta ósken generativ pobegtiń uzınlıǵı 8 sm, ondaǵı gumshalar sanı 8-29 dana. May ayınıń úshinshi 10 kúnliginde gúllew fazası gúzetildi. (1-keste). Keyreuktıń miywelew fazası iyun ayınıń 3 shi 10 kúnligine tuwrı keledi (2015).

Biziń shárayatta keyreuk birinshi jıldıń ózinde generativ dáwirge ótip tuqım berdi. Keyreuktıń bir shaqasındaǵı tuqım sanı 12 den 40 danaǵa jetedi, tuqım qanatshalarınń payda bolıwı shaqanıń tiklengen tárepinen baslanadı. Keyreuktıń ayırım túplerinde 2 shi jılı jaqsı miywe beredi, yaǵ'nıy sanı 3000-9000 danaǵa jetedi.

Úsh jıllıq keyreukte pobegtiń ósiwi eki jıllıq pobegtiń joqarg'ı tárepinde baslanadı, reńi qızǵ'ısh sarı. Pobegtiń joqarg'ı tárepinde jaylasqan japıraqları top bolıp jaylasadı [1].

Miyweniń pisiwi oktyabr ayınıń 3 shi 10 kúnligine tuwrı keledi. Tórtinshi jılı keyreuktıń boyı 22 sm ge jetkende, onıń aylanasınıń diametri 44 sm. Keyreuktıń tolıq gúllewi iyul ayınıń 15 sánesine tuwrı keledi. Bul waqıtqa kelip 2 generativ pobeg maksimal ósip, razmeri 40 sm ge jetedi, ondag'ı gúllerdiń sanı 81, bul shaqalar kúshli shaqalanǵan, sol pobeglerdiń joqarg'ı tárepindegi gúller siyrek, al tómengi gúller bir-birine tıǵız jaylasadı, olar ósken sayın siyreklese baslaydı.

Bir jıllıq pobegtegi shaqalar sanı 18, uzınlıǵı 11 sm, olardıń kópshiligi quwrap baslanǵanlıǵı málim boldı. Iyul' ayınıń 2 shi 10 kúnliginde keyreuktıń biyikligi 55 sm, al onıń sırtqı kóleminiń (kronasınıń) diametri 80 sm ge jetedi. Usı waqıtta miywelew dáwiri baslanadı. Jıllıq pobeg uzınlıǵı 41 sm, olarda miywe qanatshaları sentyabr' ayında payda bola baslaydı. Hawa temperaturasınıń joqarılawına baylanıslı (42°-43°) keyreuktıń kópshilik túrlerinde miyweler tolıq pispegenligi málim boldı.

Keyreuktiń tiýkarg'ı fenologiyalıq fazalarınıń baslanıw sáneleri (2013, 2014, 2015- jıllar)

Baqlaw jılları	Túri	Vegetaciya		Gumshalaw		Güllew		Miywelew	
		Baslanıwı	Aqırı	Baslanıwı	Aqırı	Baslanıwı	Aqırı	Baslanıwı	Aqırı
2013	Keyreuk	4.03	10.XI	15.05	20.08	15.06	10.09	15.07	20.08
2014	Keyreuk	15.04	10.XI	13.05	25.08	10.06	15.06	20.07	20.08
2015	Keyreuk	5.03	8.X	7.05	30.08	8.06	10.09	23.07	23.08

Juwmaqlap aytqanda mádeniy jaǵdayda keyreuk jaqsı ósip rawajlanadı, kóp shaqalardı payda etedi, waqıttıń ótiwi menen qaptal shaqalar kem-kemnen juwanlanıp baslaydı, keyin úlken kólemli kóp shaqalar (krona) payda

etedi, nátiyjede bas paqaldıń basqa paqallardan parqı bolmay qaladı, óziniń ontogenez dáwirin tolıq ótedi. Keyreuktiń jasıl massasınıń zúráátliligi 1,3 ts/ga miywe sani bir túpte 10-300 danaǵa jetedi.

Ádebiyatlar

1. Ережеев С., Балтабаев М. Эколого-биологические особенности *Salsola orientalis* G.Gmel. (Кейреук) в условиях Северо-западных Кызылкумов. В сб. Некоторые вопросы обогащения естественных пастбищ Каракалпакской части Кызылкумов. - Нукус: qoi, -С. qı-qoi.

2. Мамасалиев И. Ботаническая характеристика и хозяйственное значение. Кейреук (*Salsola orientalis* G.Gmel.) и его изменчивость в Узбекистане. Автореферат. –Ташкент: 1970.

3. Тажимуратов П. Эколого-биологические особенности и продуктивность растений в опытах по фитомелиорации пастбищ Каракалпакского Устюрта. Автореферат. –Ташкент: 1981.

REZYUME

Biz uch yil davomida *Salsola Orientalis* S.G.Gmelning bio-ekologik xususiyatlarini organdik.

РЕЗИМЕ

В течении трёх лет мы изучали био-экологические особенности *Salsola Orientalis* S.G.Gmel в условиях культуры.

SUMMARY

For three years we have been studying the bio-ecological features of *Salsola Orientalis* S.G.Gmel in the conditions of culture.

СУР РАНГЛИ ҚОРАҚҰЛ ТЕРИЛАРИНИНГ ТОВАРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Р.У.Турганбаев – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент

Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали

Таянч сўзлар: қорақўл кўйлари, қорақалпоқ зот тип, маҳсулдорлиги, тери тип.

Ключевые слова: каракульские овцы, каракалпакский породный тип, продуктивность, смушковой тип.

Key words: karakul sheep, Karakalpak petrean type, productivity, krimmer type.

Республикамызда мустақиллик йилларида сур қорақўл зотларининг селекциясини ташкил этиш орқали унинг зотдорлигини яхшилаш борасида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилди. Бунинг натижасида мазкур зотнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб тери, жун ва гўшт маҳсулдорлигини оширишга эришилди.

Дунё миқёсида қорақўлчилик соҳасида ҳар хил рангдаги териларга, айниқса, сур рангли қорақўл териларига талаб ортиб бормокда. Қорақўлчилик соҳаси жадал ривожланаётган давлатларда қорақўл кўйларининг ноёб рангдаги турларини кўпайтириш ва уларнинг селекцион асосларини яхшилаш талаб этилмокда. Шу боис республикамызда қорақўлчиларининг асосий вазифаси сур зот типидagi кўйлар сонини кўпайтириш ҳамда кимматбаҳо ва камёб рангли қорақўлнинг барқарор етиштирилишини таъминловчи юқори маҳсулдор ихтисослаштирилган ҳайвонлар подасини яратишдан иборат. Бунда генофондни сақлаш, селекция усулларини такомиллаштириш ва янги турдаги, экспортга йўналтирилган маҳсулотни етиштирувчи ранг-баранг ва нақшинкор жингалак гулли қорақўл кўйларини яратиш борасида илмий тадқиқотлар долзарб бўлиб ҳисобланади.

Экспериментал тадқиқотлар Тўртқўл туманининг “Қизилқум” наслчилик хўжалигида амалга оширилган. Наслчилик хўжалигининг умумий майдони 675843 гектар бўлиб, шундан 534850 гектари – яйловлардир. Тадқиқотлар 1992 йилдан 2012 йилгача бўлган даврда рангига кўра турдош бўлган ҳайвонлардан олинган наслга орасида ўтказилган. Бунда илмий ишлар ранг-баранглик кесимида кўра қорақўл териси товарлик хусусиятлари ўрганилган.

Жун толаси узунлиги қорақўлчилик соҳасида терининг асосий товарлик хусусиятларини белгиловчи кўрсаткичлардан бири ҳисобланади [2].

Жуннинг узунлигини ўлчаш шуни кўрсатадики, у ясси типдаги шамчироқ гулли қорақўлда энг калта ($10,4 \pm 0,44$), ундан кейингиси камар ($10,5 \pm 0,50$), сўнгра пўлати сур ва ўрик-гул (тегишли равишда $10,6 \pm 0,64$ ва $10,7 \pm 0,35$) бўлади

Ўрик-гул ранг-барангликдаги кўзичокларда сурлик даражаси 3/10 ва 4/10-71,3% ни, камар рангли кўзичокларда 68,8% ни, шамчироқ гул ранг-барангликдаги кўзичокларда 67,2%, пўлати сур кўзичокларда 61,3% ни ташкил этган. Кам даражадаги сурлик (1/10, 2/10) асосан шамчироқ гул рангида ва ўрик гул рангида қўзатилади. Пўлати сур кўзичокларда ушбу кўрсаткич 3,7% ни ташкил қилди.

Аниқландики, камар ва ўрик гул ранг-баранглик турларда жингалаклик тўлиқ ўралмаганда жун толасининг бир тегислиги кўпроқ намоён бўлади 3/10-4/10, шамчироқ гул ва пўлати сур ранг-баранглигида эса кам даражали сурлик даражаси ҳам намоён бўлади - 4/10-5/10.

Ранг-барангликнинг яққол ифодаланиши, жилваланиши, ранглар ва ранг-барангликнинг текислиги кўп жиҳатдан сур қорақўлининг гўзаллиги ва бетакрорлигини таъминлайди.

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, сур рангини ва унинг ранг-баранглигини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар бўйича шамчироқ гул кўзичокларда сезиларли фарқ қилади. Улар орасида ўрик гул (27,9%), пўлати сур (23,8%) ва кизил камар (21,3%) ранг-барангликдаги кўзичокларга нисбатан ранг-баранглиги яққол ифодаланувчи кўзичоклар кўпчиликти ташкил қилади. Ранг-барангликнинг энг