

Biologiya. Geografiya

PESTICIDLER HÁM OLARDIŇ AQÍBETLERI HAQQÍŇDA

K.A.Qosnazarov – biologiya ilimleriniń kandidati, docent

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

O.Temirbekov – biologiya ilimleriniń kandidati, docent

I.R.Ermakova – magistrant

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

Tayanch so'zlar: pestitsid, ekologiya, tabiat, irrigatsiya, melioratsiya, kimyoviy moddalar.

Ключевые слова: пестицид, экология, природа, ирригация, мелиорация, химические элементы,

Key words: pesticides, ecology, nature, irrigation, land reclamation, chemical elements.

Insanlardıń juwapkershiliksiz, jobasız hám nam ıssızlıq penen is háreketlerdi júrgiziwleri Aral teńizi ekologiyalıq apatshılıǵınıń kelip shıǵıwınıń tiykarǵı sebepshisi boldı. Al, jer júzindegi tiykarǵı ekologiyalıq qıyralıwlar bolsa, ol milliy rawajlanıw qáddine hám jolına, jámiyettiń ideyologiyasına yamasa dinine ǵana baylanıslı bolıp qalmay, bárinen de burın insanlardıń hám jámiyettiń tábiyat aldındaǵı jetkiliksiz juwapkershiligi esaplanadı [5:93].

Túslik Aral teńizi boylarında tábiyatqa hám qorshaǵan ortalıqqa antropogenlik tásir etiw - bul aymaqta keskin ekologiyalıq ózgerislerdi hám apatshılıqlardı keltirip shıǵardı. Solay etip, Aral ekologiyalıq mashqalası biziń zamanımızdın regionallıq mashqalasınan jer juziniń globalıq mashqalasına aylandı [4:64].

Túslik Aral teńizi boylarında júz bergen ekologiyalıq ózgerislerge baylanıslı qurıp qalǵan Aral teńiziniń ultanlarınan shańlı-duzlardıń kóteriliwi hám qorshaǵan ortalıqqa túsiwi, olardıń túrli dárejelerdegi tásirlerin izertlew jumısları 1981-jıldın gúzinde Orta Aziya ilim-izertlew irrigatsiya hám melioratsiya institutınıń sol waqıttaǵı bas direktori V.A.Duxovniydın ilimiy basshılıǵında izertlew isleri baslandı. Bul jumıslardı orınlaw ushın tiykarınan R.M.Razakov, I.B.Ruziyev hám Q.A.Qosnazarovlar juwapker izertlewshiler etip belgilendi.

Nátiyjede Aral teńizi mashqalaların sheshiw boyınsha kóp (1981-1990) jıllıq izertlew isleriniń nátiyjeleri boyınsha belgilep berilgen mashqalaların kópshiligi artıǵı menen sheshildi. Dúnya tariyxında bunday mashqala hesh qashan ushıraspaǵan hám onıń elege shekem analogı joq. Sonlıqtan, házirgi dáwirde Aral hám Aral teńizi mashqalaların tolıq sheshiw uchın dúnyanıń kópshilik ilimpazları birgelikte birlesip izertlew islerin dawam etip atır hám ol dawam ete beređi [2:96, 4:64].

Aral teńiziniń qurıwı, Aral hám Aral boylarındaǵı ekologiyalıq apatshılıq usı aymaqlardıń shólleniwine alıp keliw menen birge jáne bir mashqalanı –qorshaǵan ortalıqtıń awıl xojalıǵında qullanılatuǵın ximiyalıq preparatlar menen pataslanıw mashqalasın keltirip shıǵardı [3:76].

Insanlar ushın eń zıyanlı ximikatlardıń biri - bul pestitsidler esaplanadı.

Pesticidler qullanılıw obekti, organizm ishine kiriw jolı, tásir qılıw xarakteri hám ximiyalıq quramına qaray klassifikaciyanadı. Qanday zıyanlı organizmge qarsı isletiliwi, yaǵnıy qullanılıw obektine qarap, pestitsidler tómendegishe túrlerge bólinedi:

- 1) insekticidler – nasekomalardı qırıp taslaytuǵın qurallar;
- 2) antifidantlar – ósimliklerdi hám materiallardı ziyankeslerden saqlaytuǵın zatlar;
- 3) akaricidler – ósimlikqor kenelerge; nematocidler – ósimlik nematodalarına;
- 4) limacidler – baqanshaqlı kurtlarǵa; rodenticidler – kemiriwshilerge;
- 5) fungicidler – zamarrıqlar qozdırwshı keselliklerge;
- 6) baktericidler – bakteriyalarǵa;
- 7) gerbicidler – awıl xojalıǵı eginleriniń arasındaǵı jabayı shópplerge;
- 8) arboricidler – puta hám yarım puta ósimliklerge qarsı qullanılatuǵın qurallar;
- 9) attraktantlar – nasekomalardı shaqırıwshılar,

10) repellentler – nasekoma hám olardı qorqıtıwshı zatlar,

11) algicidler – suw otlarına qarsı qullanılatuǵın preparatlar hám t.b. [6:368].

Kompleksli tásir etiw kushine iye bolǵan pesticidler de bar. Máselen, tuqımlardı dárilewde isletiletuǵın pesticidler fungicid, baktericid, insekticid hám basqa da wazıypalardı orınlawı mumkin.

Birinshi ret DDT 1873-jılı avstraliyalı ximik Otmaro Tseydler tárepinen sintezlenedi. Alınǵan bul zat kóp waqıtqa shekem qullanılıw ornın tappadı. 1939-jılı shvecariya ximigi P.Myuller onıń insekticidlik qásiyetin aytadı. 1942-jılı preparat satıwǵa shıǵarıldı hám planeta boylap óziniń jurisin basladı. Ol ekinshi dúnya juzlik urıs dáwirindegi eń iri medicinalıq mashqala bolǵan taspı tifi hám bezgek parazit keselliklerin juqtırwshılardı qarsı guresiwdiń haqıyqat quralı boldı. DDT-nıń adamlar ushın záhárliligi sonshelli tómén boldı, ol tiftiń aldın alıw ushın denegse sebildi. DDT-nıń bah'ası salıstırmaı tómén bah'ada bolıwınan onı AQSh áskeriy kushlerin ornlastırıwdan aldın suıyır shıbınları hám bezgek shıbınları tolıq joq etiw maqsetinde Tınısh okeanniń atawlarına sebip shıǵıwǵa qollandı [8].

DDT ti islep shıǵarıw 1946-jıldan baslap Moskva hám Vurnarı qalasında baslandı. Onı jılına 20 mın tonnadan kóbirek sanda qollandı. Nátiyjede kóp aymaqlar zıyanlandı, qáwipli doza azıq awqat ónimlerine de tústi. Bul kemshilik DDT-nıń insekticid sıpatındaǵı uqıplılıǵın tóménletti hám 1970-jılları onı óndiriw jáne qullanıw júdá qatań tártipte ótkerildi.

DDT-nıń dúnya mashtabındaǵı eń ayrıqsha xızmeti :

DDT-nıń járdeminde 1944-jılı yanvarda Neapolda tif epidemiyası saplastırıladı;

1965-jılı DDT járdeminde İndiyada bezgek keselinen birde adam ólmeydi, al 1948-jılı usı keselden 3 mln. adam ólgen edi. AQSh milliy akademiyaınıń ilimiy bahalawı boyınsha 1970-jılı DDT nı qullanıw arqalı bezgek keselinen 500 mln. adam aman saqlap qalıǵan [7].

İndiyada DDT nı qullanıwdan Dum-Dum lixoradkasınan (juqtırwshı qum shıbını esaplanadı) 1950-shi hám 1960-jılları kóp adamlar qutqarıp qalınadı. Tiyisli ólshemniń saqlanbawı, hádden tısqarı qullanıw areallarınıń dúnyada artıp ketiwinen hám onıń zah'árliligi esapqa alınbawınan kóp ǵana insanlardıń ólimlerine alıp kele basladı.

Sebebi, DDT túsken orınlarında, uzaq waqıtlar tarqalmastan tiri organizmlerge ólimshi tásir etti. AQSh ta 1972-jılı DDT nı qullanıw qadaǵan etildi. Dúnyanıń kópshilik mámleketlerinde 70-jıllarǵa kelip onı qullanıw shegaralandı hám pútkilley qadaǵan ete baslandı. SSSR mámleketinde de XX ásirdiń 70-jılları arnawlı qadaǵan etildi. Soǵan qaramastan, Orta Aziya mámleketlerinde eger 1960-jıllarda pesticidlar sanı bir jıldı jan basına esaplaǵanda bir kilogrammǵa jetpeytuǵın bolsa, 1980 jıllardıń aqırına kelip bul kórsetkishler 3 mártege arttı.

Solay etip, pesticidlerdi sanaatlıq mashtapta islep shıǵarıw hám olardı ámeliyatta túrli tarawlarda qullanıw, planetamızda jasawshı adamlarǵa sezilerli dárejede payda keltirdi, biraq keltirgen zıyanı paydasına salıstırǵanda ádewir úlken boldı.

Zavodta insekticid Sevin (karbaril, 1-naftil-N-metilkar-

bamat), metilizocianattıń α -naftol menen tórt xlorlı uglerod qatnasındaǵı reakciyası arqalı alınatuǵın edi. Metilizocianat zavodta hár birinde 60 mın litrge jaqın suyuqlıq sıyatuǵın úsh bólimde qazılǵan jerdegi orında jaylastırılǵan. Qayǵılı waqıyanıń tiykarǵı sebebi metilizocianat gazınıń shıǵıwınan, zavodtıń ıdısında joqarı qaynaw temperaturasında (39,5 °C), avariya klapınında basım kúsheyip onıń jarılıwına sebepshi bolǵan. Nátiyjede 3 dekabr 1984- jılı 0:30 dan 2:00 ge shekem atmosferaǵa 42 tonnaǵa jaqın záhárli puwlar shıǵadı. Payda bolǵan gaz bultları karxanǵa jaqın 2 km jerdegi temir jol vokzalıń hám baǵlardı jawıp turǵan. Kópshilik adamlardıń ólimine sebep bolıp, ol jerde xalıqtıń tıǵız jaylasıwı, xabardar bolmaıwı hám medicina xızmetkerleriniń jetkiliksizliginen kelip shıqqan. Pesticidler — bul sintetikalıq ximiyalıq zatlar bolıp, tiykarınan XX ásirdeń ekinshi yarımınan baslap kóp mámleketlerde awıl xojalıǵı eginleriniń ónimdarlıǵın arttırıw ushın keńnen qollanıldı. Biraqta, bunday ximikatlardı sanaatta islep shıǵarıw, planetamızda jasawshı adamlar ushın, paydasınan zıyanı kóp ekenligi málim bolıp qaldı.

Pesticidlerdiń jer biosferasına ximiyalıq tásiiri hám onıń aqıbetleri júdá ayanışlı. Olar adamlarda hám hayuanlarda túrli qıylı mutaciya hám kesellikler, reproduktivlik hám gormonallıq sistemalardıń isten shıǵıwına, immunitettiń páseyiwı, rak hám tuwma kemshiliklerdiń bolıwına alıp keledi.

Pesticidler qorshaǵan ortalıqqa túskenen soń kóp waqıtqa shekem saqlanadı hám yarım tarqaladı (1-keste).

1-keste. Geypara záhárli zatlardıń qorshaǵan ortalıqta yarım tarqalıwı

Záhárli zatlardıń ataması	Yarım tarqalıw dáwiri	Ortaliq
DDT	10-jıl	Topiraq
TXDD	9-jıl	Topiraq
Atrazin	25-ay	Suw (pH= 7,0)
Benzoperilen	14-ay	Topiraq
Fenantren	138 kun	Topiraq
Karbofuran	45 kun	Suw (pH= 7,0)
Fosforiltioxolinler	21 kun	Topiraq (t=+15 S)
Iprit	7 kun	Topiraq (t=+15 S)
Zarin	4 saat	Topiraq (t=+15 S)

Jer júzlik den sawlıqtı qorǵaw shólkemi (JJDSQSh) maǵlıwmatları boyınsha tiykarınan tikkeley pesticidler menen islesiwı arqalı dúnya júzinde 2 mln.ǵa jaqın adamlardıń záhárileniwı dizimge alınǵan.

Qaraqalpaqstanlı ilimpazlar Kurbanov A.B., Eshanov T.B., İbragimov M.Yu., Konstantinova L.G., Temirbekov O., Kosnazarov K.A.(2002) lardıń alıp barǵan ilimi – izertlew isleriniń nátiyjeleri boyınsha 16 jıl dawamında (1980-1995) Qaraqalpaqstan Respublikasınıń aymaǵında qollanılǵan záhárli ximiyatlardı analizlep kórgenimizde usı dáwir ishinde 69 atamaǵı ulıwma kólemi 32157 tonna 100% isker tásir etiwchi zatlı- pesticidlerdiń qollanılǵanlıǵı málim boldı [3:76].

Qollanılǵan pesticidlerdiń yarımınan kóbireginiń (53,9%) 44,0% ti ózinde metall tutıwshı anorganikalıq birikpelerge kiredi, 14,7% ti fosfororganikalıq birikpeler, 14,7% ti karbon kislotasınıń galoid almasqan analidleri.

Barlıq qollanılǵan pesticidlar 100% záhárli esaplanadı. Kuchli toksik zatlar (SDYAV) 6,1%, joqari toksik - 16,7%, ortacha toksik - 36,4% hám tómén toksikalıq - 40,9% ti iyeleydi.

Respublikada 16 jıl dawamında hár gektar aydalatuǵın jer ushın ortasha 82,9 kg. Pesticidler 100% isker zattan, olardıń derlik yarımı (53,9%) paxtashılıqta qollanılatuǵın defoliaciya esaplanadı.

8364,5 tonna 100% t.e. gerbicidler sali atızlarına salındı, bul sol dáwirde qollanılǵan pesticidlerdiń 26,0% in quraydı. Sońǵı 16 jıl ishinde pesticidlerdiń adamlardıń sawlıǵına tásirin úyregende tuwma anomaliyalar, jatır moynı eroziyası, nefrit, asqazan hám on eki barmaqılı ishek

jaralari, bronxiallıq astma, xolelitiyoz, xronikalıq bronxit, jurektiń ishemiikalıq keselligi, revmatoidlik artrit, gipertonıya, xronikalıq otitis media, anemiya ekologiyalıq ortalıqtıń pesticidler menen toyinganlıǵı artıwı menen jıldan-jılǵa artıp baradı [3:76].

Magniyli xlorat defoliantınan intensiv paydalanıw revmatoidlik artrit, nefrit, nefroz, asqazan jarası hám on eki barmaqılı ichkek jarası, xronikalıq bronxit, bronxiallıq astma, xronikalıq otitis media hám gipertenziya rawajlanıwına da ules qosadı.

Untaq kúirt muǵdarın arttırıw menen nefroz, asqazan jarası hám on eki barmaqılı ichkek jarası artadı [2:96, 3:76].

Tómendegı 1-suwrette Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Kegeyli rayonındaǵı Aqtuba APJ daǵı awıl xojalıǵı ziyankeslerine qarsı guresiw ushın záhárli ximiyatlardı hám paxtanıń japıraqların túsiriw ushın depoliyantlardı saqlawshı jáne tayarlawshı orınlardıń hám de olardı samoletlar menen sebiw ushın islengen eski aeroporttıń (2-suwrette) kórinisleri berilgen.

Bul jerlerdin ziyansızlandırılıwına qaramastan elege shekem topiraq qatlamlarında záhárlerdin qaldıqları kórinedi. Aeroport maydanshalarında bolsa ele ósimlik ósimsheleri kórinbeydi derlik.



1.suwret. Záhárli ximiyatlardı hám depoliyantlardı saqlawshı jáne tayarlawshı orınlardıń kórinisi.



2-suwret. Eski aeroporttıń kórinisleri.

Bunday maǵlıwmatlardı júdá kóplep keltiriwimizge boladı.

Albette pesticidler menen kesellengen kesellerdiń sani jil sayın kemeyip barıwda.

Házirgi künde, "pesticidli" awıl xojalıǵına qarsı, ilimpazlar «organikalıq» jerdi islew koncepciyasın alǵa ilgerletiwde yaǵniy ximiyalıq tóginlerdi organikalıq tóginler menen almasırıw arqalı "organikalıq" diyqansılıq túsiniǵın alǵa surıwde. Hár qıylı ósimliklerdiń tábiyy ziyankeslerine qarsı guresiw tiykarında hár qıylı ósimlik túrlerin kombinaciyalawǵa tiykarlangan ziyankeslerge qarsı guresiw isleri háwij almaqta. Mine, usı koncepciya qashan keń tarqalǵan ámeliy qollanbanı tabıw haqqındaǵı sorawǵa juwap házirshe ashıq qalıwda.

Адабиётлар

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.11.2018 yildagi PQ-4007-sonli "Davlat tibbiyot muassasalari va sog'liqni saqlash idoralari xodimlarini moddiy rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni.
2. Kosnazarov K.A., Razakov R.M. Prosesı soleobrazovaniya i eolovogo perenosa v Priarale. -Nukus: «Karakalpakstan» 1991. 9-b.
3. Kurbanov A.B., Eshanov T.B., İbragimov M.Yu., Konstantinova L.G., Temirbekov O., Kosnazarov K.A. Gigienicheskaya ocenka pesticidov, primenyaemıx v Respublike Karakalpakstan. -Nukus: «Bilim», 2002.
4. Matchanov A.T., Kosnazarov K.A. Sovremennıe rekomendacii po predotvrasheniyu otricatelnıx vliyaniy pile-solevogo vipadeniya na bioticheskie i abioticheskie obekti v Yujnom Priarale». -Nukus: «Bilim» 2005.
5. 25 let deyatelnosti mejdunarodnogo fonda spaseniya Arala i novie impulsı dlya razvitiya regiona Priaralya. Agenc-tvo MFSA. 2019. www.aral.uz
6. Pesticidi: Spravochnik / Martnenko V.İ., Promonenkshv V.K., Kukalenko S.S. i dr. -M.: «Agropromizdat», 1992.
7. [Wikimedia Foundation, Inc.](https://www.wikimediafoundation.org/)

РЕЗЮМЕ

Maqolada Janubiy Orol bo'yi atrofida tabiat va atrof muhitga antropogen ta'sir etuvchi faktorlar haqida so'z etiladi. Jumladan, qayd etilgan faktorlar atrof-muhitni keskin o'zgartiradi va katastrofik holatni yuzaga keltiradi. Bu kabi o'zgarishlar hozirgi davrda nafaqat Orol bo'yi xalqlarining ekologik muammosi, balki bu butun dunyo xalqlarining ekologik muammosiga aylandi.

РЕЗЮМЕ

В статье описывается антропогенные факторы воздействующие на природу и окружающую среду в регионе Южного Приаралья. В частности упомянутые факторы резко меняют окружающую среду и катастрофическое бедствие. Также изменения являются на данный момент не только экологической проблемой Приаралья, но и проблемой всего мира.

SUMMARY

The article discusses anthropogen factors which impact on nature of Aral Sea territory and environment. Therefore the mentioned factors rapidly changes environment and create catastrophic situations. These changes are not just ecological problem of Aral Sea territory it is also the ecological problem of all people of the world.

УЎК 595.754

ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ЧЎЛ ХУДУДЛАРИ ЯРИМҚАТТИҚҚАНОТЛИ (HEMIPTERA-HETEROPTERA) ХАШАРОТЛАР ФАУНАСИ

М.Ж.Медетов – биология фанлари доктори

Д.М.Мусаев – биология фанлари бўйича фалсафа доктори
ЎзР ФА Зоология институти

Ж.К.Абдуллаева – таянч докторант

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети

Б.Д.Гулимбетов – таянч докторант

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти

А.Ж.Юсупова – эркин изланувчи

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Таянч сўзлар: Жанубий Оролбўйи, шимолий-ғарбий Қизилқум, жанубий Оролқум, қандалалар, доминант, рецессив, турқум оила, авлод, тур, фитофаг, зоофаг.

Ключевые слова: Южный Арал, северо-западный Кызылқум, Южный Аралқум, клопы, доминантный, рецессивный, семейство, род, вид, фитофаг, зоофаг.

Key words: South Aral Sea, north-west Kyzylkum, South Aralkum, bedbugs, dominant, recessive, Category family, generation, species, phytophage, zoofag.

Кириш. Яримқаттиққанотсимонлар хашаротлар синфининг катта қисмини ташкил этиб, ер шарининг барча ҳудудларида кенг тарқалган. Бугунги кунда дунё микёсида қандалаларнинг 75 оилага мансуб 50 мингдан ортиқ тури тарқалган бўлса, Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Қозоғистонда қандалаларнинг 32 оилага мансуб 1250 дан ортиқ тури рўйхатга олинган [4,5]. Марказий Осиёнинг ғарбий Тянь-Шан тоғ ва тоғолди ландшафтларида қандалаларнинг 27 оила 247 авлодга мансуб 523 тури тарқалгани аниқланган [2,3]. Қандалаларнинг аксарият турлари ўсимликхўр бўлиб, улар 200 дан ортиқ ўсимлик турлари билан озикланади. Масалан, АҚШ да *Lugus* авлодига мансуб *Lugus hesperus* тури ғўза ҳосилига йилига 30 млн., бошқа қишлоқ хўжалик экинларига 40 млн доллар миқдорида иқтисодий зарар келтирмоқда, Калифорнияда эса сўқир қандалалар қишлоқ хўжалигида умумий зарарқундаларнинг 10 % ни ташкил этиб, йилига 56 млн доллар қийматида зарар келтирмоқда [5]. Гарчи қандалаларнинг аксарияти зарарқунанда ҳисоблансада, аммо улар орасида зарарқунанда хашаротларни кириб фойда келтирадиган турларига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳозирда дунё микёсида фойдали қандалаларнинг 7 кенжа оила 561 авлодга мансуб 3400 та тури рўйхатга олинган [4].

Материал ва усуллар. Тадқиқотлар 2019-2020 йиллар давомида жанубий Оролбўйи чўл ҳудудларида

олиб борилди. Тадқиқотларда Кириченко (1951), Kerzhner (1962), Асанова ва Исаков (1977) ҳамда Голуб (2012) ларнинг усуллари асосида олиб борилди. Қандалаларни йиғишда диаметри 34-40 см бўлган энтомологик тутқич (сачок) ва диаметри 1X1 бўлган ок мато лардан фойдаланилди. Бунда даласининг 5 та нухтасидан сачокнинг 20 та ҳаракати орқали намуналар олинади. Олинган намуналардаги қандалалар сони алоҳида ҳисоб қилиниб сачокнинг 100 та ҳаракатидаги қандалаларнинг ўртача сони ҳисоб қилинди.

Олинган натижалар. Тадқиқотлар натижасида жанубий Оролбўйи чўл ҳудудлари сифатида шимолий-ғарбий Қизилқум ва жанубий Оролқумнинг табиий ва антропоген ҳудудларидан яримқаттиққанотсимон хашаротларнинг ўрганилган оилалар сони 12 тани, авлодлар сони 65 тани, турлар сони эса, 97 тани ташкил этди. Аниқланган қандалаларнинг асосий турлари Miridae оиласига мансуб, зарарқунанда фитофаглар (*A. lineolatus*, *L. kalmi*, *L. Gemellatus*, *L. pratensis*, *S. Calcarata*, *N.elongata* ва бошқ.) ни ташкил этсада, тадқиқотлар натижасида зарарқунанда хашаротлар билан озикланиб фойда келтирадиган Nabidae ва Reduviidae оилаларига мансуб 15 тур (*N. palifer*, *N. fesus*, *R. disciger*, *R. elegans* ва бошқ.) фойдала қандалаларнинг ўрганилган ҳудудларда тарқалгани маълум бўлди (1-жадвал).