

**Sheńgel (Halimodendron halodendron Pall) ósimliginiń
Bio-ekologiyalıq ózgeshelikleri**

Baltabaev Muratbay Torebaevich – *biologiya ilimleriniń kandidatu, docent*

Koniratbaeva Dilaram Baxadir qızı – *student*

dilaramkoniratbaeva@gmail.com

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

**БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ЧИНГИЛЬ
(Halimodendron halodendron Pall)**

Балтабаев Муратбай Торбаевич – *кандидат биологических наук, доцент*

Кониратбаева Диларам Бахадировна – *студент*

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

**BIO-ECOLOGICAL PROPERTIES OF THE PLANT
(Halimodendron halodendron Pall)**

Baltabaev Muratbay Toreboyevich – *Candidate of Biological Sciences, Associate Professor*

Koniratbaeva Dilaram Bakhadirovna – *student*

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Tayanch soʻzlar: manzarali oʻsimlik, ildiz, poya, barg, gul, kurtak, urugʻ, morfologik xususiyatlar, polikarpik, ildizpoya, vegetativ koʻpayish, koʻp yillik, daraxt, buta, oʻt tanali oʻsimlik, formatsiya, assotsiatsiya, yerosti va yerusti qismi.

Rezyume. Maqolada Qoraqalpogʻiston sharoiti uchun istiqbolli tur sifatida "Chingil" oʻsimligining biologik va ekologik xususiyatlari bayon etilgan. Uning shoʻrlangan tuproqlarga, qurgʻoqchilikka chidamliligi va kuchli rivojlangan ildiz tizimi ushbu xususiyatlarga bogʻliq boʻlib, Orol dengizining qurigan tubiga ekilishi ushbu hududning ekotizimini yaxshilash imkonini beradi.

Ключевые слова: декоративные растение, корень, стебель, лист, цветок, почка, семя, морфологические особенности, поликарпический, корневище, вегетативное размножение, многолетнее растение, дерево, кустарник, травянистое растение, формация, ассоциация, подземная и надземная части.

Резюме. В статье описаны биологические и экологические характеристики растения «Чингил» как перспективного вида для условий Каракалпакстана. Его устойчивость к засоленным почвам, засухе и сильно развитая корневая система обусловлены этими характеристиками, а посадка на пересохшем дне Аральского моря позволит улучшить экосистему этого района.

Key words: decorative plant, root, stem, leaf, flower, bud, seed, morphological features, polycarpic, rhizome, vegetative propagation, perennial plant, tree, shrub, herbaceous plant, formation, association, underground and above-ground parts.

Summary. The article describes the biological and ecological characteristics of the Halimodendron halodendron plant as a promising species in the conditions of Karakalpakstan. Its resistance to saline soils, drought, and a strongly developed root system are due to these characteristics, and by planting it on the dried bottom of the Aral Sea, we will be able to improve the ecosystem of this area.

The cinquefoil plant is a perennial shrub that reproduces vegetatively from seeds and rhizomes.

Kirisiw. Sheńgel-Halimodendron halodendron (Pall) Voss -bul sobıqlılar tuqımlasınıń sheńgel (Halimodendron Fisch) tuwısına kiretuǵın ósimlik bolıp esaplanadı [1]. Sheńgel sózi grekshe «halimos»-duzlı, «dendron»-aǵash degen mánisti bildiredi [2], [3]. Sheńgel (Halimodendron halodendron Pall.) – bul duzǵa hám qurǵaqshılıqqa shıdamlı, tikenekli, jalpaq japıraqlı puta deneli ósimlik.

Sheńgel (Halimodendron halodendron Pall.) bioekologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw hám onı Qaraqalpaqstan sharayatında kóklemzarlastırıwda, janlı qora sıpatında mádeniylestiriw boyınsha ilimiy izertlewler bir tájiriye uchastkasında alıp barıldı. Ol Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń «Grachevaya rosha»daǵı tájiriye uchastkasında jaylasqan. Jumista tájiriye uchastkanıń ıqlım hám agroximiyalıq sıpatlaması tolıq úyrenilgen. Izertlew jumisları ulıwma qabil etilgen metodlar tiykarında alıp barıldı.

Ádebiyatlar analizi hám medtologiya. Laboratoriya sharayatında tuqımlardıń óniwi hám ósiwin úyreniw M.K.Firso hám M.G.Nikolaeva [1] lardıń metodikalıq kórsetpelerine [1] tiykarlanıp alıp barıldı. Ósimliklerdiń ritmi hám rawajlanıwı boyınsha fenologiyalıq baqlawlar

I.N.Beydeman [1] metodikası boyınsha alıp barıldı. Tamır sisteması transheya metodı Taranovskaya [1], boyınsha úyrenildi. Güllew biologiyası hám tuqım ónimdarlıǵı A.N.Ponomarev, I.V.Vaynagiy [1] metodikaları boyınsha analiz etildi. Vegetativ hám generativ organlardı morfologiyalıq sıpatlaw I.G.Serebryakov, Al.A.Fedorov hám basqalardıń [1], metodikaları arqalı orınlandı.

Nátiyjeler. Sheńgeldiń biyikligi 2-3 metrge jetetuǵın, shaqaları jayılp yamasa tik ósetuǵın ósimlik. Eski shaqaların qabıǵı qońırlaw-bawır reńli, toq kúl-bawır reńli, al jas shaqaları bolsa qońır-kúl reńli boladı. Shaqaları bawır-kúl reńli, sarı-kúl reńli, jalańash.

Gúl keseshesi gúze-qońıraw tárizli. Gúlleri (2) 4 - 5 mm uzınlıqta bolıp, gúl baldaqlarında orınlasqan. Gúltajı japıraǵı qızǵısh-kókshil, siyrek hallarda aqshıl boladı. Ayırım gúl tajı japıraqları dóńgelek yamasa sopaq dóńgelek, 14-18 mm uzınlıqta boladı, gúl tajı japıraq astı bólimi 3-4 mm uzınlıqqa iye. Androceyleri eki toparǵa birikken atalıqlardan turadı. Sobıǵı jalańash uzınlıǵı 4-5 mm ayaqshalı, eki jaǵında sıziqshası boladı. Jup pár tárizli japıraqlı tikenli ósimlik. Japıraq kósherleriniń ushı tikenekli. Japıraqları 1-3 jup, tegis qırıl, teris máyek tárizli

yamasa jınıshke pánje tárizli, uzınlığı 12-40 mm japıraqlar úsh múyeshli, tikenli. Gúl keseshesiniń uzınlığı 4-5 mm, keń tissheli. Gúlleriniń uzınlığı 2 sm, ol gúl janı japıraqshasına iye, Sobıgınıń uzınlığı 1,2-1,5 sm, ushı tiken menen tamamlanğan (1-súwret).



1-súwret. Sheńgel (*Halimodendron halodendron* Pall)

Eski shaqalarınıń qabıǵı toǵın qońır yamasa toǵın sarǵısh qońır, al jas shaqalarınıń qabıǵı qońır reńge jaqınaraq sur túsli bolıp, qabırshaqlanıp túsedi. Shaqası qońır, surǵısh-sarı, jolaqlı, jalańash túrde boladı. Jas shaqaları gedir-budur, qısqa, jipek tárizli, jabısıp turatuǵın sur-gúmis reń yamasa aq túkli yamasa jalańash bolıp keledi.

Búrtikleri 4 sırtqı qabırshaqlı, sur túkli, baslanğan jerinde (túbinde) 2 tikenı bar. Tamır sisteması kúshli rawajlanğan, kúshli tarmaqlanğan.

Tábiyiy arealı: Sheńgel Qaraqalpaqstan Respublikasınıń qurǵaq ekosistemaların keń kólemde iyelegen dominant túr esaplanadı. Watanı tiykarınan Orta Aziya biraq, Mongoliya, Kaspiy teńiziniń qubla, qubla-batis bóleginde hám Qara tenizdiń arqa tárepindegi aymaqlarǵa shekem de sozılǵan. Aral tenizi hám dárya tegislikleriniń shorlanğan jerlerinde ushırasadı [4].

Sheńgeldiń japıraqları gúmis sıyaqlı jasıl bolıp kórinedi, jipek sıyaqlı júnler menen qalın túklengenligi sebepli ol sur reńli bolıp kórinedi. Ol tek metall reńi menen emes, al sulıw forması menen de ózine tartadı. Taq pár tárizli, quramalı, ushında tikenı bar 1-3 mayda sopaq bólekshelerden ibarat, bul ósimliktiń japıraqlarınıń uzınlığı 3 sm ge jetedi (2-súwret).



2-súwret. Sheńgel (*Halimodendron halodendron* Pall.) japıraǵınıń kórinisi

Japıraq qoltıǵında top gúlleri jaylasqan, japıraqları ekewden bolıp, uzınlığı 0,5-1 mm, joqarı jaǵı ushlı, biz tárizli, gúl sabaǵınıń túbinde yamasa joqarǵı bóleginde ornalasqan. Gúlleri eki jınısı, xosh iyisli. Gúlkese gúze-qońıraw pishinli, qıya tiykarlı, ólshemi 3-6 × 3-5 mm, bes gúl tajı japıraqtan quralǵan, tıǵız jabısqan tükler menen qaplanğan, keń úsh múyeshli tisleri bar. **Gúltajı** (gúltajı japıraq) gúbelek tárizli, ashıq-sıya túsli, aqshıl qızǵısh reńli, qoyıw qızıl reńli, qızǵısh yamasa derlik aq reńli bolıp, 5 japıraqtan ibarat: jelqomı shama menen 1,5 × 1,3 sm, derlik dóńgelek, ushında az ǵana oyıqlı, tómengi jaǵına qaray qısqa sına tárizli tırnaq ólsheminde tarılǵan; «eskek»leri sozılınqı, sozılǵan sızıqlı, «jelqom» menen derlik birdey uzınlıqta, baslanğan jerinde (túpki tárepinde) 2-5 mm uzınlıqtaǵı «qulaqshaları» bar; qayıqshası iyilgen, eskeklerinen qısqaq (3-súwret). Atalıqları 10, androcey eki toparǵa birikken atalıqlardan turadı. Túyinshesi baldaqlı, joqarǵı, apokarplı, qampayǵan (isingen), jalańash; stilodiy (gúlli ósimliklerdiń analıǵınıń túynek penen analıq awzı ortasındaǵı bólimi) bólegi jip tárizli, iyilgen, kishi awızshalı. Gúllewden soń da kórinis dawam etedi. Gúl túyinshesinen júdá iri, 2-3 sm ge shekem keńeyiwshi, qońır-sarı reńli, sopaq tárizli sobıqlar payda boladı, olar salmaǵı sebepli paqaldan tómengge salbırıp turadı hám shaqa ústinde ózine tán monshaq yamasa shashaq payda etedi. Ádette, miyweler japıraq bóleklerinen bir neshe ese úlken boladı.



3-súwret. Sheńgel (*Halimodendron halodendron* Pall.)-diń gúllew paytı

Sobıqlardıń ishinde zaytun reńli jasıl tuqımlar jaylasadı. Bul ósimliktiń miywesi avgust-sentyabr aylarında tolıq pisedi, biraq orta zonada ósimlik hár jılı miywe bermeydi.

Bul ósimliktiń ájayıp qızǵılt-qızıl gúlleri menen bezeletuǵın bunday dekorativ formasına itibar beriw orınlı – bul ájayıp hám búgingi kúnde oǵada kóp tarqalǵan qoyıw qızıl formadaǵı ósimlik. Suwıqqa júdá shıdamlı ósimlik esaplanadı.

Dodalaw. (Sheńgeldi kóbeytiw usılları) Sheńgel ósimligi tamır sisteması kúshli bolıwı hám qaptal ósimtelerdiń aktiv payda bolıwına baylanıslı bul puta ápiwayı vegetativ usıllar menen jaqsı kóbeyedi. Biraq sheńgel kóshirip egiwdi jaqsı kórmeydi hám tamırlanıwı qıyın, tamırdan kógere-tuǵın ósimliktiń shıdamlı ekzemplırların alıw ushın olardı basqa ósimliklerge sabıw kerek boladı.

Ádette eń dekorativ formalardı beretuǵın hám putanıń rawajlanıw tezligin jaqsılaytuǵın sarı akaciyanıń úlgerinen paydalanıladı. Qálemsheler de tap sonday shanslıwdı talap etedi. Kóbinese bul ósimlik ushın qos egiw usılı qollanılıp, dáslep sarı akaciyanı robiniya tamırına, sonnan keyin sarı akaciyanıń paqalına sheńgeldiń ózin egiw usılı qollanılıdı. Biraq ápiwayı shanslıw arqalı da múmkin.

Sheńgeldi tuqımnan da kóbeytiw múmkin, tuqımnan egiw texnikası haqqındaǵı maǵlıwmatlar hár qıylı.

Kópshilik qánigelerdiń pikirinshe, ósimlik tuqımları qabıqlarınıń qattılıǵı sebepli 1 saat dawamında kislotada dárilewi yamasa qoy-eshki dárisi (qıy) menen qayta isleniwi hám skarifikaciyanıwı – tuqım qabıǵına iyne menen shanslılıwı kerek. Biraq, ayırım baǵmanlar bunday proceduralarsız da tuqımlar júdá tez ónıp shıǵatuǵının atap ótedi.

Sheńgeldi tuqımnan ekkende tuwrıdan-tuwrı onıń turaqlı ósip turǵan ornına ámelge asırǵan maqul. Kóshpeli

usılǵa jol qoyılmaydı: ósimlik kóshirip ótkiziwge shıdamaydı. Tuqımlar aldın-ala tógilgen topıraqqa batırılıdı. Egindi egiwdiń eń qolaylı waqtı gúz ayları (oktyabr, noyabr).

Xojalıq áhmiyeti. Shóllerdi kóklemzarlastırıwǵa qolaylı dekorativ ósimlik bolıp, shorlangan topıraqlarda ósedı. Sonday-aq, janlı qoralar, jollar hám salmalardı qaplaw ushın da paydalansa boladı. Haywanlar onsha jaqsı jemeydi. Gúzde hám qısta túyeler hám qoylar miywelerdi hám túsken japıraqlardı jaqsı jeydi. Shól aymaqlarında janılǵı ushın paydalanadı. Tamırnan jún ushın sarı boyaw alınadı. Güllew dáwirinde pal beriwshi ósimlik esaplanadı.

Juwmaq. Ulıwma aytqanda Sheńgel (Halimodendron halodendron Pall.) – bul duzǵa, qurǵaqshılıqqa shıdamlı, tikenekli, pal beriwshi, tábiyiy azot payda etiwshi, tamırı kushli rawajlangan, tuqımnan hám urqan tamır arqalı vegetativ jol menen kóbeyetuǵın kóp jıllıq puta deneli ósimlik.

Ádebiyatlar

1. Балтабаев М.Т. Био-экологические особенности *Crambe orientalis* L. в условиях Южного Приаралья.: Автореф. канд. ... биол. наук. – Ташкент: 2010.
2. Горшкова С.С. Род Чингиль-Halimodendron Fisch. – Флора СССР. – М. – Л.: АН СССР, 1945. Т. XI. – С. 323-324.
3. Гроссгейм А.А. Род Halimodendron Fisch. – Чингиль. – Флора Кавказа. – М.-Л.: АН СССР, 1952. Т.-V, – С. 239 - 240.
4. Флора Европейской части СССР. Род Чингиль-Halimodendron Fisch.– Л.: «Наука», 1987. Т. YI. – С.37-39.