

**QARAQALPAQSTAN AYMAĞINDA TOPÍRAQ QATLAMLARÍNÍN TÁBIYIY STRUKTURASÍNÍN
ÖZGERIWINE ANTROPOGEN FAKTORLARDÍN TÁSIRI**

Nurlanov Abdijan Sagindikovich – úlken oqıtıwshı

nurlanovabdijan65@gmail.com

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

**ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЧВЕННЫХ СЛОЕВ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА**

Нурланов Абдижан Сагиндинович – старший преподаватель

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

**THE IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE CHANGE IN THE NATURAL STRUCTURE
OF SOIL LAYERS IN THE TERRITORY OF KARAKALPAKSTAN**

Nurlanov Abdijan Sagindikovich – senior teacher

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Tayanch so‘zlar: Qaraqalpaqstan topıraqları, antropogen skelet, texno-gorizontlar, topıraq degradaciyası, shorlanıw, Aral teńizi, ekologiyalıq yadro, texnogen qatlamlar, melioraciya, jer resursları.

Rezyume. Maqalada regiondaǵı suwǵarmalı diyqanshılıqtıń meliorativlik jumısları, sanaat, turmıshlıq shıǵındılar hám Aral teńizi krizisi nátiyjesinde topıraq qatlamında júzege kelgen texnogen ózgerisler haqqında bayan etilgen. Texno-gorizontlardıń topıraqtıń biologiyalıq aktivligi hám ekologiyalıq turaqlılıǵına tásiri bahalanadı.

Ключевые слова: почвы Каракалпакстана, антропогенный скелет, техно-горизонты, деградация почв, засоление, Аральское море, экологическое ядро, техногенные слои, мелиорация, земельные ресурсы.

Резюме. В статье рассматриваются вопросы о техногенных изменениях почвенных слоев региона в результате мелиоративных работ орошаемых земледелия, промышленных и бытовых отходов, а также кризиса Аральского моря. Оценивается влияние техно-горизонтов на биологическую активность и экологическую устойчивость почв.

Key words: soils of Karakalpakstan, anthropogenic skeleton, technogenic horizons, soil degradation, salinization, Aral Sea, ecological core, technogenic layers, land reclamation, land resources.

Summary. The article examines the technological changes in the region's soil layers resulting from irrigated agriculture, industrial and household waste, as well as the Aral Sea crisis. The impact of technogenic horizons is being assessed on soil biological activity and ecological stability.

Kirisiw. Tábiyiy ortalıq XXI ásirdeń sońǵı jıllarında ilimiy texnikalıq progress jetiskenlikleri menen qurallanǵan óndiris kúshleriniń hám adamlardıń tásiri nátiyjesinde úlken ózgerislerge ushırmaqta. Xalıq sanınıń tez pát penen ósip barıwı hám olardıń kúndelikli talaplarına sáykes sanaat hám awıl xojalıǵı ónimleri menen támiynleniwde óndiristegi progrestiń artıp barıwı, tábiyiy ortalıqtaǵı atmosferanıń, suwlardıń hám topıraq qatlamlarınıń pataslanıwına, ósimlik hám haywanat dúnyasınıń kemeyiwine, hátteki birneshe mın jıllar dawamında buzılmay kiyatırǵan tábiyat baylanıslarınıń belgili dárejede ózgeriwine sebepti bolmaqta.

Bul aymaqtıń tábiyiy-klimat sharayatlarınıń ózgeriwı, Ámiwdárya deltası menen baylanıslı geomorfologiyalıq ózgeshelikleri hám Aral teńizi krizisi menen ótip atırǵan ekologiyalıq processler topıraq qatlamınıń qalıplesiwı hám rawajlanıwına kúshli tásir etpekte.

Qaraqalpaqstan aymaǵında shól sharayatında suwǵarmalı diyqanshılıqtıń rawajlanıwı, meliorativlik ilajlardıń uzaq jıllar dawamında ámelge asırılıwı, sanaat hám transport infrastrukturasınıń rawajlanıwı nátiyjesinde topıraqlardıń tábiyiy evolyuciya jolı sezilerli dárejede ózgeriske ushırǵan. Nátiyjede topıraq profilinde insan iskerligi tásirinde qalıplesken jasalma qatlamlar, yaǵnıy texno-gorizontlar payda bolıp, olar topıraqtıń antropogen skeletin quramaqta. Bul skelet topıraqtıń fizikalıq-ximiyalıq, biologiyalıq hám ekologiyalıq qásiyetlerine tikkeley tásir kórsetip, onıń ónimdarlıǵın hám turaqlılıǵın tómendetiwshi tiykarǵı faktorlardan birine aylanǵan.

Tiykarǵı bólim. 1960-80-jıllarda Oraylıq Aziya respublikaları ekonomikasınıń agrar tarawındaǵı paxta

shiyki zatın jetistiriwde egislik jerlerdiń shekten tıs ashılıwına baylanıslı neshshe ásirlerden beri teńizdi suw menen támiynlep kelgen Ámiwdárya hám Sırdáryanıń suw resurslarınan racionallı paydalanıwı nátiyjesinde Aral teńiziniń qurıwı menen ekologiyalıq krizis jaǵdaylarınıń payda bolıwına alıp keldi. Maydanı 68 mın km² bolǵan Oraylıq Aziyadaǵı eń iri kóllerdiń biri bolǵan Aral teńizi keyingi 45-50 jıl ishinde teńizdiń qáddi 53 absalyut metrden 8,7 metrge tómendep, suw maydanı 3500-3800 km² ge qısqardı, al suwınıń dúziligi bolsa túslik Araldıń batis bóliminde 120-180 g/l ge kóterilip, teńizdiń suwdan qurǵaǵan maydanı 4,8 mln gektardan asıp ketti.

Aral teńizi suw beti kóleminiń qısqarıwı nátiyjesinde teńiz átirapındaǵı jerlerden 800 mın gektarǵa shamalas qamıslar quwrıp qaldı, 1,3 mln ga toǵaylıqlar ıǵallıqtıń jetispewi nátiyjesinde joq bolıp ketiw qáwipi bar. Tábiyiy jaylawlardıń zúraátliligi 5 mln centner ot jem birligine tómendep, 100 ge jaqın iri hám mayda kóller quwrıp olardıń ornında shorlaqlar payda boldı [1].

Házirgi dáwirde jer resurslarınan paydalanıw procesinde antropogen faktordıń kúsheyip barıwı topıraq qaplamınıń tábiyiy dúzilisi hám funktsional ózgesheliklerine sezilerli tásir kórsetpekte. Ásirese, qurǵaqshıl hám yarım qurǵaqshıl aymaqlarda jaylasqan regionlarda topıraq degradaciya processleri tezlesip, ekologiyalıq turaqlılıqtıń buzılıwı global mashqalalar qatarına kirip barmaqta.

Keyingi jıllarda Aral teńizi jaǵalawlarında hawa rayınıń klimatlıq sharáyatlarınıń belgili dárejede ózgeriwı sezilmekte. Jawın-shashınlardıń ortasha muǵdarı máwsimler boyınsha tómendedi, teńiz suwınıń qaytıwı menen qurǵaq territoriyalardıń maydanı kóbeyip, jer

betinen ortasha suwdıń parlanıwı jılına 1700 mm ge jetti, al, hawańnı ıǵallıǵı 10 % ke kemeydi. Hawanın temperaturası qısta tómenlep jazda 3-5 gradusqa kóterildi. Jaz máwsiminde hawa rayınnı temperaturası ayırım kúnlerde +50 S⁰ shekem jetti.

2020-jıl izertlew maǵlıwmatlarına qaraǵanda eger jer júzinde globalasıw házirgi muǵdarda dawam etse yarım ásir ishinde jer júzi xalqınıń 3,5 milliard adamı jaramsız hawa rayı sharayatında jasawı múmkin. Jıllıq ortasha temperatura +29 S dan asatuǵın jer qurǵaqlıǵınıń (Saxara shóline usaǵan) ulıwma maydanı 0,8 procentinen 19 procentke kóteriledi. Jerdegi ortasha jıllıq temperaturanın hár bir qosımsha dárejege kóteriliwi milliardqa jaqın adamlardı jasawı ushın jaramsız hawa rayı sharayatlarında qalıwı múmkin [2].

Aral teńiziniń qurıwı menen baylanıslı ekologiyalıq krizis Qaraqalpaqstan topıraqlarınıń jaǵdayın jáne de qıyınlastırdı. Teńiz túbinen kóterilip atırǵan duz hám shań aerzolları topıraq betinde texnogen qatlamlar payda etip, shorlanıw hám shólleniw processlerin kúsheyip barmaqta. Bul jaǵday topıraqtıń ekologiyalıq yadrosın hálisiretip, tábiyǵıy ózin-ózi tiklew mexanizmlerin izden shıǵarmaqta [3]. Sol sebepli aymaq topıraqlarında qalıplesken antropogen skelet hám texno-gorizontlardıń kelip shıǵıwı, rawajlanıw basqıshları hám ekologiyalıq aqıbetlerin tereń ilimiy tiykarda úyreniw bul global masshtabta insanlar keleshegi aldında turǵan eń áhmiyetli máselelerdiń biri bolıp qalmaqta.

Insanlar tárepinen tábiyatqa bolǵan qatnasındaǵı ózgerisler házirgi dáwirde sonday úlken masshtabta boldı, olar tábiyattıń rawajlanıwında júz beretuǵın teń salmaqıqtıń buzılıwına qáwip tuwdırmaqta. Uzaq waqıtlar dawamında tábiyat adamlar ushın zárúr bolǵan materiallıq baylıqlardı tawsılmaıtuǵın derek sıpatında qarap kelgen. Tawsılatuǵın resurslar óz nábwetinde qayta tiklenetuǵın hám qayta tiklenbeytuǵın bolıp bólinedi. Qayta tiklenbeytuǵın resurslar paydalanǵan waqıtqa qaraǵanda 100 márte áste qayta tiklenetuǵın yamasa qayta tiklenbeytuǵın resurslardı óz ishine aladı. Tábiyat resursları hár qıylı tezlikte tiklenedi: haywanlar – bir neshshe jıldı, toǵaylar 60-80 jıldı ónimdarlıǵın joǵaltqan topıraqlar – bir neshshe mın jıllarda qayta tiklenedi. Paydalanıw teziliǵi qayta tikleniw dárejesinen asıp ketse onda pútkilley joq bolıp ketiwine alıp keledi.

Ótkerilgen ilimiy tallawlar sonı kórsetedi, Qaraqalpaqstan aymaǵında topıraq qaplamasınıń házirgi jaǵdayı uzaq jıllar dawamında ótken intensiv antropogen tásirlerdiń quramalı nátiyesi bolıp tabıladı. İnsan xojalıq iskerligi topıraqtıń tábiyiy evolyuciyalıq rawajlanıw procesin tezlestirip, kóp jaǵdaylarda onıń ekologiyalıq turaqlılıǵın izden shıǵarǵan. Antropogen skelettıń qalıplesiwi topıraq profilide jańa texno-gorizontlardıń payda bolıwına alıp kelip, tábiyiy gorizontlar menen óz ara quramalı baylanıstı júzege keltirgen.

Qaraqalpaqstan topıraqlarında antropogen skelet hám texno-gorizontlardıń qalıplesiw processlerin ilimiy jaqtan bahalawda bir qatar ilimpazlardıń kózqarasları áhmiyetli teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi. Atap aytqanda, ózbek topıraqtanıwshısı A..Abdullaevtiń atap ótiwinshe, suwǵarılauǵın aymaqlarda topıraqtıń tábiyǵıy morfologiyalıq dúzilisi insan iskerligi nátiyesinde ózgerip, jańa antropogen qatlamlar qalıplesedi hám bul process topıraq evolyuciyasınıń jasalma tezlesken basqıshı sıpatında

kórinedi. Onıń pikirinshe, bunday aymaqlarda topıraq ónimdarlıǵın saqlaw ushın biologiyalıq belsendi qatlamdı qorǵaw birinshi gezektegi wazıypa esaplanadı[4].

Melioraciya tarawındaǵı izertlewleri menen tanılǵan N.Tursunov suwǵarıw sistemalarınń nadurıs basqarılıwı topıraqtıń ekilemshi shorlanıwına alıp ketetuǵın ayırıqsha atap ótedi. Ilimpazdıń pikirinshe, jer astı suwları qáddiniń kóteriliwi hám minerallastırılǵan suwlardıń kapıllıy kóteriliwi nátiyesinde topıraq profilinde shorlı texno-gorizontlar qalıplesedi hám bul process agroekosistema turaqlılıǵına úlken qáwip tuwdıradı [5].

Egislik jerlerdiń shorlanıwı nátiyesinde topıraqtıń ónimdarlıǵın támiynleytuǵın gumus shirindileri tómenlep topıraq bonitetine keri tásirin tiygizbeke. Mısalı 2008- jıldı Qaraqalpaqstanda awıl xojalıǵı ónimlerin jetistiriwdiń kólemi 1980 jılǵa salıstırǵanda paxta jetistiriw 41,7 % ke, ǵálle jetistiriw 57,7 % ke, salı jetistiriw 5,8 % ke tómenlep ketken.

Aralboyı aymaqlarınıń ekologiyalıq mashqalaların úyrengen R.Xojaniyazov bolsa Aral teńizi ultaninan tarqalǵan duz hám shań aerzolları Qaraqalpaqstan topıraqlarınıń joqarı qatlamında jańa texnogen qaplam payda etkenin atap ótedi. Onıń ilimiy juwmaqlarına bola, bul aerzol qatlamlar topıraqtıń fizikalıq qásiyetlerin jamanlastırıp, biologiyalıq aktivligin keskin tómenletedi hám shólleniw procesin tezlestiredi [6]. Suwǵarıw nátiyesinde payda bolǵan texno-gorizontlar aymaqta topıraq degradaciyasınıń tiykarǵı faktorlarınan biri bolıp, olar suw-hawa rejiminiń buzılıwı, mexanikalıq tıǵızlanıw hám ekilemshi shorlanıw processleri menen tıǵız baylanıslı. Bul jaǵday topıraqtıń biologiyalıq aktivligin tómenletip, mikroorganizmler hám topıraq biotası jumısınıń shekleliwine alıp keledi. Nátiyede topıraqtıń ekologiyalıq yadrosı hálisirep, onıń ózin-ózi tiklew imkanıyatları keskin azayadı. Shorlı hám shorlaqlı texno-gorizontlar bolsa bul processti jáne de tereńlestirip, ósimlikler ushın fiziologiyalıq stresti kúsheyetuǵın ortalıqtı qalıplestiredi.

Óndirislik kárxanalar menen transporttıń atmosfera quramına shıǵarıp atırǵan záhárli gazleriniń tásirinde jer júzinde klimat sharayatlarınń ózgeriwine shól maydanlarınń artıp barıwı menen suw resurslarınıń kemeywi, awıl xojalıq egislik jerlerdiń ónimdarlıǵınıń páseyiwi, sheklenbegen túrde ximiyalıq tóginler pesticidlerdi paydalanıwdıń artıwı nátiyesinde hár jılı 4,0-4,7 million gekardan aslam jer resursları xojalıq aylanısınan shıǵıp, tábiyiy ortalıqtıń ekologiyalıq digradaciyaǵa ushırawı artpaqta.

Sanaat hám turmıslıq shıǵındılar tásirinde qalıplesken texnogen qatlamlar aymaqta salıstırmalı kishi maydanlardı iyelegen bolsa da, olardıń ekologiyalıq qáwiplilik dárejesi joqarılıǵı menen ajırılıp turadı. Bunday qatlamlar quramında ushırasatuǵın awır metallar hám basqa da zıyanlı birikpeler topıraq arqalı azıq shınjırına kirip barıw qáwpın payda etedi. Bul bolsa topıraqtıń tek ǵana awıl xojalıǵı áhmiyetin emes, al onıń sanitariyalıq-gigienalıq funkciyaların da sezilerli dárejede shekleydi. Aral teńizi ultaninan tarqalǵan aerzol qatlamlar bolsa topıraq betin qaplap, samal eroziyasın kúsheytedi hám shólleniw procesiniń jedellesiwine sebep boladı.

Aral teńizi qurǵaǵan ultaninan kóterilgen 80-100 mın tonna duzlı, qumlı shańlar teńizden 500 km aralıqlarda maksimal tarqalıp awıl xojalıq egislik jerleriniń kushli shorlanıwına sebepshi bolmaqta. Qaraqalpaqstan

Respublikası boyınsha ulıwma egislik maydanlarınń 26,2 procenti halsız shorlangan, 37,2 procenti orta shorlangan, 35,2 procenti kúshli shorlangan, 1,2 procenti júdá kúshli shorlangan topıraqlar qatarına kiredi.

Antropogen skelet qansha kúsheyse, topıraqtń biologiyalıq belsendi hám ónimdarlıq bólegi sonsha qısqaradı. Bul jaǵday aymaqta agroekosistemalardıń turaqlılıǵına úlken qawıp tuwdırıp, awıl xojalıǵı ónimdarlıǵın tómendetedi hám ekologiyalıq qawipsizlikti támiyinlew máselesin qıyınlastıradı. Sol sebepli texno-gorizontlardı tek ǵana topıraqtń buzılǵan qatlamları sıpatında emes, al aymaqtaǵı ulıwma ekologiyalıq sistemanıń áhmiyetli indikatorları sıpatında bahalaw zárúr.

Topıraq degradaciyası hám shólleniw proceslerin izertlegen B.Ortiqov qurǵaqshıl aymaqlarda antropogen júk artıwı nátiyjesinde topıraqtń ekologiyalıq yadrosı qısqarıwın atap ótedi. Onıń pikirinshe, texno-gorizontlardıń keńeyiwı topıraqtń ózin-ózi tiklew qábiletin tómendetedi hám bul process uzaq múddette jer resurslarınń turaqlılıǵına unamsız tásir kórsetedi [7]. Sonday-aq, S.Karimov antropogen ózgergen topıraqlardı bahalawda olardıń ximiyalıq quramı menen bir qatarda biologiyalıq kórsetkishlerin de esapqa alıw zárúrligin atap ótedi. Ilimpazdıń pikirinshe, topıraqtń ekologiyalıq jaǵdayın tolıq

bahalaw ushın gumus muǵdarı, mikrobiologiyalıq belsendilik hám duz rejimi kompleksli túrde úyreniliwi kerek.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan topıraqlarınıń antropogen skeleti hám texno-gorizontlarınń geografiyalıq evolyuciyası aymaqta júz berip atırǵan ekologiyalıq hám xojalıq processleriniń tikkeley kórinisi bolıp tabıladı. Izertlewler sonı kórsetedi, suwǵarılatuǵın diyqansılıqtıń keńeyiwı, meliorativlik sistemalardıń uzaq múddetli tási, sanaat hám turmıslıq shıǵındılar jáne Aral teńizi krizisi nátiyjesinde topıraq qaplamasınıń tábiyǵıy strukturası sezilerli dárejede ózgergen. Nátiyjede topıraq profilinde túrli kelip shıǵıwǵa iye bolǵan texno-gorizontlar qalıplesip, olar topıraqtń ekologiyalıq yadrosın halsiretken.

Texno-gorizontlardıń tipologiyalıq analizi olardıń kelip shıǵıwı hám ekologiyalıq aqıbetlerin tereńirek ańlaw imkaniyatın berdi. Suwǵarıw hám shorlanıw menen baylanıslı texno-gorizontlar aymaqta eń keń tarqalǵan bolıp, topıraqtń ónimdarlıǵınıń tómenlewine tiykarǵı rol atqaradı. Sanaat hám texnogen qatlamlar bolsa ekologiyalıq qawıp dáregi sıpatında ayrıqsha itibardı talap etedi. Aral ultaninan tarqalǵan aerosol qatlamları topıraq degradaciyası hám shólleniw processlerin kúsheytıp, aymaqtıń ekologiyalıq turaqlılıǵına úlken qawıp tuwdırmaqta.

Ádebiyatlar

1. Бахиев Е.С., Ешанов Г. «Дәуиримиздің экологиялық машқалалары». –Нөкіс: «Билим», 2001.
2. Бушуев М. «Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам». –Москва: 2020.
3. Yusupov Q.Q. Aralboyı aymaǵında shólleniw processleri hám olardıń aldın alıw. - Nókis: Qaraqalpaq mámleketlik universiteti baspası, 2018. 176- b.
4. Abdullaev A.A. Tuproqshunoslik asoslari. - Tashkent: «O‘qituvchi», 2016.
5. Tursunov N., Qodirov M. Suwǵoriladigan tuproqlarning meliorativ holati. - Tashkent: «Fan va texnologiya», 2018. 198-b.
6. Xojaniyazov R., Jumaniyazov S. Ekologicheskiye problemı regiona Priaralya. - Nókis: Qaraqalpaq mámleketlik baspası, 2019. 184-b.
7. Ortiqov B.B. Qurǵaqshıl aymaqlarda topıraq degradaciyası hám shólleniw processleri. - Tashkent: «Fan», 2017.